



*universidad del sureste*



aplomos

Aplomos normales

Predispone a un animal a poseer una mejor y mas sana aptitud para su funcion

Debe efectuarse sobre una superficie plana

De modo que apoye de toma normal todos sus miembros

Dispone de un conjunto de alteraciones que se manifiestan con claudicaciones alteradas

Aplomos normales del miembro anterior

Estos miembros aportan el 60 al 65 % del peso del animal

Están mas expuestas a lesiones y traumas

La forma correcta de observarla es estando de forma equilibrada

Aplomos anormales del miembro anterior

Cerrado adelante

La distancia entre los cascos es menor a la que se separa ambos miembros

La partes externa del pie sufre mayor desgaste

Abierto adelante

La distancia entre el centro de los pies es mayor a la distancia del encuentro

Soportan mayor peso sobre el lado interno del pie

izquierdo

Cuando camina mete los miembros hacia adentro

Posibles lesiones traumáticas e inconvenientes

estevado

La línea imaginaria divide al casco en dos partes iguales

Cuando camina saca el miembro hacia afuera

Aplomos normales del miembro posterior

Deben tener un aspecto de equilibrio entre la masa muscular y la osea

Para observarlo se traza una línea perpendicular hacia el suelo

Aplomos anormales del miembro posteriores

Se conoce como abierta de garrones, los tarsos son mas abiertos de lo normal

Abierto de atrás: esta alteración muestra que la línea que separa ambos pies en el suelo, es mayor a la que separa ambas tuberosidades isquiáticas