

- **Materia:** ZOOTECNIA OVI-CAPRINA
- **Tema:** Dentición Ovi-Caprina

- **Carrera:** Medicina veterinaria y zootecnia
- **Cuatrimestre:** 7º
- **Alumno:** Edgar Uriel Encino López

DENTICION OVICAPRINA

La dentadura es:

- Heterodonta, porque posee distintas piezas dentarias llamadas incisivos (I), premolares (PM) y molares (M)
- Incompleta, porque no tiene caninos (C)
- Difiodontia, porque posee inicialmente dientes de leche o temporarios que luego son reemplazados por dientes definitivos o permanentes.
- En el paladar superior no posee incisivos sino un rodete fibromucoso llamado rodete dentario

DIENTES DESIDUOS

- Dentición de leche (temporaria): formada por 20 dientes: 8 incisivos y 12 premolares, siendo su fórmula dentaria:
 $(I0/4 C0/0 PM3/3 M0/0) \times 2 = 20$
- los dientes de leche son pequeños, cónicos (con cuello marcado) y menos duros que los definitivos
- La salida de las pinzas ocurre en torno al nacimiento, hacia el mes de vida ya tiene todos sus incisivos erupcionados y hacia los tres meses, éstos alcanzan su tamaño máximo. Las pinzas se empiezan a desgastar a partir de los tres meses, siguiendo posteriormente los demás incisivos (medianos y extremos). El proceso de desgaste continúa, de modo que al año los dientes son muy cortos y están más separados entre sí

DIENTES PERMANENTES

- Dentición de adulto (definitiva o permanente): formada por 32 dientes: 8 incisivos, 12 premolares y 12 molares, siendo su fórmula dentaria:
 $(I0/4 C0/0 PM3/3 M3/3) \times 2 = 32$
- Los dientes definitivos son más grandes, angulares (sin cuello marcado) y muy duros
- Los dientes definitivos empiezan a salir a partir del año, año y medio, comenzando con las pinzas. El proceso se completa con la erupción de los extremos, que suele ocurrir entre los 3 y 4 años

ERUPCIÓN DE LOS DIENTES EN EL OVICAPRINO

Tipo de incisivos	Dentición de leche		Dentición de adulto	
	Edad	Categoría	Edad	Categoría
Pinzas (centrales)	0 - 1 semanas	Diente de leche (DL)	10 - 18 meses	2 dientes (2D)
Primeros medianos	1 - 2 semanas		18 - 24 meses	4 dientes (4D)
Segundos medianos	2 - 3 semanas		24 - 36 meses	6 dientes (6D)
Extremos	3 - 4 semanas		36 - 48 meses	8 dientes o boca llena (8D o BLL)