



---

**Universidad del Sureste**

---



**Medicina Veterinaria y Zootecnia**

**Delia Escamilla Méndez**

**Zootecnia de Pequeñas Especies**

**Tuxtla Gutiérrez Chiapas**

**01/Dic/2021**

## QUE DEBEMOS HACER ANTES DE VACUNAR (REVISIÓN CLÍNICA)

Cuando llega en cliente tenemos que hacer la anamnesis del paciente, no debe tener algún síntoma de enfermedad para poder aplicar la vacuna, debemos auscultar al paciente, escuchar al corazón, ruido intestinal, pulmones. Si todo está bien procedemos a vacunar al cachorro.

## QUÉ ASPECTOS INMUNOLOGICOS DEBEMOS DE CONSIDERAR EN LAS VACUNAS

Que las vacunas pueden provocar reacciones alérgicas, diarreas, vómitos, hinchazón.

## DESCRIBE UN POCO SOBRE EL CALOSTRO Y EL EFECTO INMUNOLOGICO EN EL CACHORRO


La primera leche después del parto se caracteriza por ser rico en proteínas y sales minerales, con una escasa proporción de lactosa, le da una gran protección al cachorro por lo menos el primer mes de vida.

## EN DONDE SE DEBEN COLOCAR LAS VACUNAS EN PERROS Y QUE PUNTOS DEBEMOS CONSIDERAR PARA VACUNAR A LOS GATOS.

Perro: se aplica de forma subcutánea en el lomito o de forma intramuscular en las piernas.

Gatos: se aplica de forma subcutánea en las extremidades.

## COMO SE CLASIFICAN LOS PARÁSITOS INTESTINALES (HELMINTOS) CUALES ATACAN AL PERRO Y LOS GATOS COMO SI DIFERENCIAN



### Perros

Entre los helmintos intestinales que afectan a los caninos se encuentran: *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Strongyloides stercoralis*, *Dipylidium caninum* y *Toxocara canis*, entre otras; éstos ocasionan deterioro de la salud animal debido a que afectan el bienestar y la vitalidad del hospedero.

Gatos

Áscaris (*Toxocara cati*), son gusanos redondos que miden entre 4 y 8 cm de largo.

Anquilostomas (*Ancylostoma tubaeforme*), son gusanos redondos pequeños, de 1 cm aproximadamente.