



# ZOOTECNIA DE CONEJOS



## UNIDAD III

---

- **ALUMNO: DARWIN KEVIN MORENO AGUILAR**
  - **MAESTRO: MVZ JAIME ANTUAN CASTILLO**
- 



# PROGRAMA SANITARIO Y DE BIOSEGURIDAD PARA LA GRANJA CUNICULA

## MANEJO HIGIÉNICO SANITARIO DEL CRIADERO

**Bioseguridad:** es el conjunto de medidas, controles y barreras que intervienen en la prevención de enfermedades. La bioseguridad debe aplicarse en el interior del criadero y en el exterior del mismo.

Bioseguridad puertas adentro: medidas que evitan la propagación o difusión de agentes patógenos dentro de una granja.

Bioseguridad puertas afuera: medidas encaminadas a prevenir la entrada de nuevas enfermedades.

Dentro del concepto de bioseguridad se puede englobar a todas las acciones necesarias para proporcionar al consumidor productos biológicamente seguros, comprende:

- Aislamiento del criadero.
- Precauciones en la introducción de otros animales al criadero.
- Aplicación de un Plan Sanitario Preventivo.
- Control de plagas (ratas - insectos). Medidas de higiene.
- Las granjas que aplican un correcto plan de desinfección consiguen un mejor estado sanitario.

En Cunicultura hay que trabajar con el concepto de medicina de la producción, cuyo objetivo es mantener la salud de los animales con buenos resultados productivos y reproductivos.

La desinfección constituye uno de los principales pilares en los que se basa la bioseguridad, ésta comprende tres etapas:

- Limpieza en seco para eliminar restos de materia orgánica.
- Limpieza y saneamiento: lavado con agua y detergente.
- Desinfección propiamente dicha.

Al final de cada ciclo productivo se realiza la desinfección terminal.

La desinfección continua es la que se realiza mientras los animales se encuentran en la granja. Ésta comprende tareas de:

- Colocación de pediluvios, aislamiento de enfermos.
- Mantenimiento de la higiene de las jaulas y los nidales.

- Control de insectos, ratas y ratones (transmiten enfermedades, contaminan alimento y agua).

Las granjas cunícola deben contar con una zona de cuarentena, aislada del resto de las instalaciones. Los animales de nuevo ingreso deberán permanecer en esa zona durante treinta días.

Evitar la visita a otras granjas o instalaciones por parte del personal o empleados de la granja.

Es importante que los empleados de las granjas no críen conejos en sus casas para evitar el riesgo de contagios.

Cuidados en la desinfección:

Al aplicar el desinfectante se deberá tener en cuenta que:

- El desinfectante sea de amplio espectro.
- La solución desinfectante sea diluida correctamente.
- La impregnación por metro cuadrado de superficie sea la adecuada.
- Buena limpieza previa de la superficie a tratar.

Pautas higiénico sanitarias preventivas

- Limpieza de jaulas, cada vez que se desocupe una jaula por traslado del animal o su muerte, se procederá a su lavado y desinfección. Lavar las jaulas, comederos, bebederos eliminando restos de materia fecal, alimento y luego utilizar algún desinfectante. Es importante la limpieza previa de los materiales, ya que los desinfectantes disminuyen su efecto o no actúan en presencia de materia orgánica.

- Retirar periódicamente el estiércol del criadero, evitando que quede amontonado dentro del mismo. Controlar el sistema de efluentes.

- Combatir exhaustivamente a ratas y ratones, ya que éstos ensucian y contaminan comederos. Transmiten enfermedades, se introducen en los nidales, matan gazapos y asustan a las madres pudiendo provocar incluso casos de canibalismo.

- Limpiar y desinfectar periódicamente los depósitos de agua y bebederos.