Universidad del sureste.

Campus Tapachula.

Introducción a la cirugía Patología y Técnicas Quirúrgicas en equinos.

Cólico Equino.

Alumno: Alejandro Morales Tapia.

Profesor: MvZ Roberto Barreda García Sedano.

QUINTO CUATRIMESTRE.

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

colico equino

colico

¿Que es el colico equino?

El cólico equino corresponde a un dolor agudo acompañado de predominio vagal que causa espasmos desde el estómago a las últimas porciones intestinales.

signos clinicos.

- dolor abdominal.
- sudaración excesiva.
- en casos más extremos se revuelvan.
- se muestran inquietos.
- doblan el cuello en dirección al estomago.
- perdida de apetito.

tipos de colico

- **Timpánico**. Se da ante la presencia de grandes cantidades de gas que no consiguen atravesar el tubo digestivo y salir del mismo. Suele seguirse un tratamiento con medicinas, aunque hay que destacar que puede llegar a ser necesaria una cirugía.
- **Impactación**. Se produce cuando los alimentos ingeridos por el caballo no circulan correctamente a través del intestino. El tratamiento está basado en medicinas o, incluso, en una intervención quirúrgica.
- **Espasmódico**. Este cólico es de tipo intermitente, es decir, está presente durante unos 20-30 minutos y desaparece, volviendo después a aparecer. Se trata con medicinas.
- **Torsión del intestino**. Es, sin duda, el caso más grave de los cólicos en caballos. Se da cuando algunos tramos del intestino llegan a retorcerse sobre sí mismos o quedan atrapados en otra zona intestinal. El tratamiento tiene que ser por cirugía.

Diagnostico.

sondeo. y en cuanto a signos clinicos se identifica el grado de gravedad del colico.

prevención.

Evitar darle alimento fermentado, no dar excesivo uso de granos en dieta, desparacitar

Tx

en colicos no tan graves, se puede tratat con farmacos como lo es principalmente la dipirona, en casos de gravedad se procede a realizar un sodeo nasogastrico por el cual se le administra cerveza o en dado caso jabón con el objetivo de generar gas y este sea expulsado, cuando es un colico por torsión se recurre a cirugía.