

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS TAPACHULA

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

5to cuatrimestre.

NOMBRE DEL DOCENTE:

MVZ. ROBERTO SEDANO.

MATERIA:

PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE EQUINOS

ACTIVIDAD:

CUADRO SINOPTICO.

NOMBRE DEL ALUMNO:

DAYANNE VAZQUEZ OLIVO.

FECHA:

02 ABRIL 22



El Cólico equino ó Síndrome abdominal agudo, en veterinaria es un signo no una enfermedad.

- ♥ se define como cólico a todo dolor abdominal de aparición súbita.

El equino por sus características anatómicas está predispuesto a presentar este problema; Sistema digestivo muy largo (30 mt.). Escasa capacidad gástrica (8 - 15 lt.) por ende tiene poca distensión, tiene una conformación muscular en forma de anillo en el estómago lo cual no le permite vomitar.



La localización de los cólicos puede clasificarse en:

Verdadero: se caracteriza porque el dolor proviene de algún punto del tubo digestivo, incluyendo glándulas anexas, como hígado y páncreas.

Falso: porque el dolor proviene de vísceras ajenas al tubo digestivo como los riñones, el útero en la hembra y los testículos en el macho.

Los caballos de todas las razas son susceptibles a presentar cólicos, también parece relacionarse con la edad de los animales, el riesgo se incrementa en caballos de 2 a 8 años de edad.

TRATAMIENTO

- ♥ Analgesia administrada intravenosamente (Banamina o sedación)
- ♥ Laxantes administrados directamente en el estómago a través de una sonda nasogástrica (aceite mineral o sulfato de magnesio/sales de Epsom)
- ♥ Rehidratación con líquidos orales o i.v.

SIGNOS CLINICOS.

- ♥ Depresión
- ♥ Inapetencia
- ♥ Levantar las patas delanteras
- ♥ Tumbarse, levantarse, moverse en círculos y tumbarse de nuevo repetidamente
- ♥ Curvar/levantar el labio superior
- ♥ Girar sobre la espalda
- ♥ Sudar
- ♥ Mayor frecuencia cardíaca (la normal es de 28-44 latidos por minuto)
- ♥ Distensión abdominal visible (aspecto de estar inflado)
- ♥ Producción de excrementos inferior a la normal o inexistente
- ♥ salivar en exceso

PREVENCION.

La dieta y la alimentación son claves en la prevención de cólicos en los equinos.

Que el caballo haga ejercicio fuera de potrero.

Verifique que el heno, la viruta, caballeriza, pastos y el entorno no tengan sustancias tóxicas, como insectos, malezas nocivas y otras materias extrañas.

BIBLIOGRAFÍA

♥ <https://www.acvs.org/large-animal-es/colic-in-horses>

♥ Síndrome Abdomen Agudo del Equino, Scpioni Hugo, et al. Pág. 2