

TEMA: EQUINOS

**MATERIA: PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DEL EQUINO**

**PROFESOR: BARRERA ROBERTO GARCIA
SEDANO**

ALUMNO: ERNESTO MARTINEZ ESPINOSA

**ACTIVIDAD. 1 PARCIAL 4 CUATRIMESTRE 5:
CUADRO SINOPTICO "COLICOS"**



¿QUE ES?

El estomago del caballo es proporcionalmente muy pequeño, en cambio el intestino delgado y grueso es sumamente largo, por lo que puede haber desequilibrio en lo que se digiere y lo que se come. Los cuales causa espasmos desde el estómago a las últimas porciones intestinales.

Es una urgencia veterinaria, que si no es atendida puede terminar con la muerte del paciente.

El cólico es más bien un síndrome que un diagnóstico, y abarca todas las causas de dolor abdominal, relacionadas con el tracto digestivo o no.

SIGNOS

Depresión, Inapetencia (falta de interés por comer), Levantar las patas delanteras, Mirar al flanco, Tumbarse más de lo habitual o en un momento distinto del normal, Tumbarse, levantarse, moverse en círculos y tumbarse de nuevo repetidamente, Curvar/levantar el labio superior, Coclear hacia el abdomen con las patas traseras, Girar sobre la espalda, Estirarse, Sentarse como un perro, Quejarse, Sudar, Mayor frecuencia cardíaca (la normal es de 28–44 latidos por minuto), Distensión abdominal visible (aspecto de estar inflado), Producción de excrementos inferior a la normal o inexistente, Diarrea, Los potros pueden girar sobre la espalda o rechinar los dientes y salivar en exceso.

DX

Viajes recientes, cambios en la alimentación o la rutina, medicamentos, otros episodios de cólico, calendario de desparasitación/vacunación

El examen físico puede incluir: Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura rectal, escuchar la presencia o ausencia de sonidos gastrointestinales, color anormal de las membranas mucosas, turgencia cutánea, pulsaciones digitales de los cascos, distensión abdominal

TX

- Dipirona para aliviar el dolor vía IM (solo al principio del cuadro es funcional)
- Zonda por la nariz, introducir con cerveza caliente, aceite o agua de jabón
 - Cirugía por torción del intestino
- Introducir la mano por el tracto rectal y retirar el exceso de excremento

CONTROL

- Dejar un recipiente con agua limpia y fresca a disposición para evitar que se genere la fermentación en el tracto digestivo. (cuando son animales de pesebre)
- En pastoreo se recomienda dar libre acceso cuando el pasto alcanza una altura mayor a los 15 cm, así evitando la falta de líquidos para tener una buena digestión.