



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia**

**PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE porcino**

**CAMPUS TAPACHULA**

**Materia:**

**PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE porcino**

**Docente:**


**Roberto sedano**

**Integrantes:**

**Alexis Antonio Velásquez Villatoro**

**Fecha:**

**26 de febrero del 2022**



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE porcino  
CAMPUS TAPACHULA

Materia:

PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE porcino

Docente:

SERGIO CHONG

Integrantes:

ALEXIS ANTONIO VELASQUEZ VILLATORO

TAREA:

Colibacilosis



# Colibacilosis

Es una de las principales enfermedades de la industria porcina y esta constituye por una enfermedad bacteriana causada escherichia coli y causa muerte en los lechones recién nacidos y los que son recientemente destetado

## Tipos de colibacilosis

### Neonatal

Las heces pueden ser claras o blancas, amarillas o marrones la diarrea aparece a las 2 o 3 horas después de la infección puede ocurrir en un lechón o en camadas enteras.

### Previa al destete en lechones

Diarrea gris o blanca y animales que se vuelven peludos y desnutridos o los animales que son a base de sustituto de leche estos pueden verse afectado por ese tipo de diarrea

### Posdestete

Es diarrea acuosa como proyectil amarilla o gris/marrón junto con una deshidratación rara vez presenta sangre y moco

### Enfermedad del edema

Ocurre simultáneamente con la diarrea posdestete y se trata de una enterotoxemia causada por cepas verotoxigénicas de E.coli

## Control y prevención

### Higiene

Limpiar la instalación después de retirar la camada, retirar y quemar camas viejas, limpiar y desinfectar el equipo

### manejo

Mantener la cama nivelada, controlar el nivel de alimento de 0.5 a 1kg por día durante cuatro o cinco días ayudar a las cerdas a criar

### Inmunidad

Practica de adopción de los lechones, usar vacuna contra el E. coli