

TEMA: ASCARIS SUM

**MATERIA: PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DE PORCINOS**



**PROFESOR: BARREDA ROBERTO GARCIA
SEDANO**

ALUMNO: ERNESTO MARTINEZ ESPINOSA

**ACTIVIDAD.1 PARCIAL 4 CUATRIMESTRE 5:
CUADRO SINOPTICO "ASCARIS SUM"**



A
V
S
C
A
R
I
D
E
O
S
U
M
A

ETIOLOGIA

Ascarideo o gusano redondo. Tamaño de los huevecillos de 85 x 80 micras.
En cerdos jóvenes hay deficiente crecimiento y tos, manchas de leche en hígado, y falta de hierro

DX

Identificar los huevecillos por flotación, y en adultos se detectan en el intestino delgado, así como manchas de leche en hígado en la necropsia, detección de los huevecillos en las heces.

SIGNOS

Neumonía, hemorragias, edema y enfisema pulmonar sobre todo en lechones, pérdida de condición, obstrucción intestinal.

TX

- Diclorvos 12-22 mg/kg de peso vivo
- Fenbendazol 3mg/kg 24 hrs x 3 días.

CONTROL

- Desparasitar a todos los ejemplares.
- Evitar hacinamiento en las porquerizas.
- Lavar y desinfectar todos los alimentos y evitar consumir carne cruda o no cocida a su totalidad.