

TEMA: CISTICERCOSIS

**MATERIA: PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DE PORCINOS**



**PROFESOR: BARREDA ROBERTO GARCIA
SEDANO**

ALUMNO: ERNESTO MARTINEZ ESPINOSA

**ACTIVIDAD.2 PARCIAL 3 CUATRIMESTRE 5:
ENSAYO "CISTICERCOSIS PORCINA"**



CISTISERCOSIS PORCINA

Etiología.

Tenia solium mejor conocida como “la solitaria”. Causada por el metacestodo o forma larvaria de la *T. solium*, que puede afectar a diferentes tejidos del organismo.

Patogenia.

La cisticercosis es una infección causada por los estados larvarios de la tenia *Tenia solium*, después de que una persona ingiere los huevos de la tenia. Las larvas se adhieren a tejidos como los músculos y el cerebro, formando cisticercos (quistes).

- Lesiones por efecto mecánico y toxialérgico que provocan reacciones especialmente cuando mueren, inflamación, fibrosis y calcificación.
- Pérdida de vista y atrofia del sistema central.

Sintomatología (solo en humanos).

- Dolores de cabeza
- Convulsiones
- Problemas de equilibrio
- Acumulación excesiva de líquido en el cerebro (hidrocefalia)
- Náuseas
- Vómitos
- Muerte

Diagnostico

Oftalmoscopia; invaginación del escólex dentro del vítreo.

Profilaxis

- Desinfectar frutas y verduras
- Desparasitación continua de cada 6 meses obligatoriamente
- No consumir aguas negras en cultivos
- No comer alimentos bien cocidos

Nota: la cisticercosis es zoonótica, la diferencia es que solamente la bacteria solo afecta a los humanos. Por ende, es importante tener en cuenta las medidas sanitarias.