

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

TAPACHULA CHIAPAS

LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCENTE :

FRNACISCO DAVID VAZQUEZ MORALES

**PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE PEQUEÑAS
ESPECIES**

TEMA:

ENSAYO SOBRE MOQUILLO

ALUMNO :

DIEGO ALBERTO REYES VELAZQUEZ

INTRODUCCIÓN

EN ESTE TEMA HABLAREMOS SOBRE DISTEMPER CANINO TAMBIÉN LLAMADO MOQUILLO, ES CONSIDERADO COMO LA PATOLOGÍA VÍRICA MÁS SERIA QUE AFECTA A LA ESPECIE ES UNA ENFERMEDAD DE ALTA MORBILIDAD Y MORTALIDAD VARIABLE, ENDÉMICA EN EL MUNDO ENTERO ESTE VIRUS ESTÁ CONFORMADO POR UNA CADENA SIMPLE DE ARN DE SENTIDO NEGATIVO , LA PRINCIPAL VÍA DE CONTAGIO ES LA DIRECTA POR AEROSOLES RESPIRATORIOS CONTAMINADOS POR SECRECIONES RESPIRATORIAS, OCULARES, ORINA Y HECES, EXISTIENDO TAMBIÉN LA TRANSMISIÓN TRANSPLACENTARIA. LA FORMA INDIRECTA ES A TRAVÉS DEL AGUA Y ALIMENTOS

DESARROLLO

EL MOQUILLO ES UNA ENFERMEDAD MUY PELIGROSA QUE LA PRINCIPAL VÍA DE CONTAGIO ES LA DIRECTA POR AEROSOLES RESPIRATORIOS CONTAMINADOS POR SECRECIONES RESPIRATORIAS, OCULARES, ORINA Y HECES, EXISTIENDO TAMBIÉN LA TRANSMISIÓN TRANSPLACENTARIA. LA FORMA INDIRECTA ES A TRAVÉS DEL AGUA Y ALIMENTOS PERROS DE TODAS LAS EDADES SON SUSCEPTIBLES AL CONTAGIO, SOBRETUDO AQUELLOS QUE TIENEN ENTRE 3-6 MESES, PERIODO EN QUE CUAL LA INMUNIDAD MATERNAL QUE HA RECIBO A TRAVÉS DE LA LACTANCIA DESCENDE. SI CUMPLIMOS EL CALENDARIO VACUNAL, ES POCO PROBABLE QUE SE INFECTE, AUNQUE NO IMPOSIBLE, TENIENDO GRAN IMPORTANCIA LA REVACUNACIÓN, YA QUE PIERDEN LA INMUNIDAD. INTERVALOS EN LOS QUE NUESTROS CANES ESTÁN INMUNODEPRIMIDOS POR ESTRÉS O PADECIMIENTO DE OTRA ENFERMEDAD, LA PROTECCIÓN TAMBIÉN DISMINUYE.

MOQUILO CANINO SÍNTOMAS (SIGNOS CLÍNICOS)

SE LLAMA MOQUILLO CANINO PORQUE UNO DE LOS SIGNOS MÁS FRECUENTES ES LA SECRECIÓN NASAL ABUNDANTE, SIN EMBARGO EL VIRUS DE MOQUILLO CANINO AFECTA MUCHOS SISTEMAS.

- RESPIRATORIO: SECRECIÓN NASAL, ESTORNUDOS, TOS, CONGESTIÓN, NEUMONÍAS.
- DIGESTIVO: VÓMITOS Y DIARREA, A VECES CON PRESENCIA DE SANGRE.
- NEUROLÓGICO: TICS, CONVULSIONES Y FALTA DE COORDINACIÓN, SON ALGUNOS DAÑOS.
- OFTALMOLÓGICO: CONJUNTIVITIS, LAGAÑAS.
- DENTAL: CRECIMIENTO ANORMAL DE LOS DIENTES.

UN PERRO ENFERMO DE MOQUILLO CANINO PUEDE PRESENTAR UNO O COMBINACIONES DE TODOS LOS SIGNOS.

EL TIEMPO QUE PASA DESDE QUE UN PERRO TIENE CONTACTO CON EL VIRUS DE MOQUILLO CANINO HASTA QUE PRESENTA ALGÚN SIGNO PUEDE TARDAR ENTRE CINCO A 24 DÍAS APROXIMADAMENTE.

EL VIRUS AFECTA CACHORROS Y ADULTOS, LOS CACHORROS ENTRE SEIS Y 12 SEMANAS, SIN VACUNAS, SEPARADOS DE SU MADRE ANTES DE TIEMPO, INMUNODEPRIMIDOS (BAJOS DE DEFENSAS), PERROS DE TIENDAS DE MASCOTAS —DONDE RECLUTAN PERROS DE TODOS LADOS—, SON LOS PERROS MÁS SUSCEPTIBLES A ENFERMARSE Y CON EL PEOR PRONÓSTICO.

CONCLUSIÓN

EL DIAGNÓSTICO DE MOQUILLO CANINO ES A MENUDO PRESUNTIVO, BASÁNDOSE EN LA ANAMNESIS DEL PACIENTE JUNTO A LOS SIGNOS CLÍNICOS MANIFESTADOS. LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RUTINARIAS NO CONFIRMAN LA SOSPECHA DE INFECCIÓN POR VMC, YA QUE NO HAY ANORMALIDADES DE LABORATORIO PATOGNOMÓNICAS DE ESTA ENFERMEDAD.