

**LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y  
ZOOTECNIA**

**PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE PEQUEÑAS  
ESPECIES**

**CATEDRATICO: FRANCISCO DAVID  
VAZQUEZ MORALES**

**ALUMNA: RAQUEL VIRGINIA  
RIZO ESCALANTE**

**giardiasis**

**1 PARCIAL**

**22/01/2022**

## giardiasis

**¿Qué es la giardiasis y quién la produce?** La giardiasis es producida por un protozoo microscópico unicelular llamado Giardia intestinalis. El parásito se encuentra en el intestino de personas o de animales infectados y se transmite en grandes cantidades a través de las heces. El parásito está protegido por una envoltura exterior que le permite sobrevivir fuera del cuerpo y en el medio ambiente durante largos periodos de tiempo. La giardiasis se presenta en todo el mundo y es particularmente común en climas cálidos. Ocasiona diarrea a una amplia variedad de especies.

**¿Cómo pueden adquirir la giardiasis mis animales?** La Giardia se encuentra en suelos, alimentos, agua o superficies que han sido contaminadas con heces de personas o animales infectados. La infección ocurre después de que los animales ingieren accidentalmente (oral) el parásito

**Cómo afecta la giardiasis a mis animales?** La mayoría de los animales con giardiasis no muestran síntomas de la enfermedad. Puede presentarse diarrea en animales más jóvenes. También pueden observarse los siguientes síntomas: heces blandas, pelaje hirsuto, gases intestinales, pérdida de peso o incapacidad para subir de peso. Las heces son de color claro, con mucosidad (babaza clara) y pueden contener materia grasa no digerida (manchas grasosas blanquecinas).

Cualquiera puede contraer giardiasis. La exposición ocurre más comúnmente a través de la ingestión oral del parásito presente en el agua o alimentos contaminados. También puede propagarse por contacto directo con materia fecal o personas infectadas (de mano a mano o de mano a boca). Esta vía puede ser la más común en los bebés y niños. La giardiasis también es una causa frecuente de la diarrea del viajero. Al beber agua no filtrada o no tratada, los excursionistas, mochileros y los que acampan tienen mayores probabilidades de infectarse. Las personas con giardiasis pueden no tener síntomas de la enfermedad o experimentar diarrea, gases intestinales, cólicos estomacales y náuseas. La enfermedad generalmente desaparece en el transcurso de unos cuantos meses.

