

Nombre de alumno: Williams Jose Luis Cruz Cruz

Nombre del profesor: inge Gaby

Materia: INTRODUCCION A LA CIRUGIA, PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE EQUINOS

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico de la unidad 3

Grado: 5

Grupo: A

Afecciones de la piel de los equinos, cólico equino. principales causas y clostridiasis en equinos (tétanos)

3.1 Sarnas

3.2 Fungosis

3.3 Píddermatitis

3.4 Habronemiasis



Introducción

La piel es el órgano más visible y grande del cuerpo además de ser una barrera anatómica y fisiológica entre el animal y el medio ambiente. Las enfermedades de la piel son una fuente de sufrimiento para el animal a través de la irritabilidad, el prurito, la desfiguración, las infecciones secundarias, las miasis y el aumento de susceptibilidad a otras enfermedades y además de comprometer el bienestar del animal y su apariencia, interfieren con la habilidad del caballo para funcionar en la monta, el trabajo o el espectáculo.

POR EDUCAR

Unidad 3

Afecciones de la piel de los equinos, cólico equino. principales causas y clostridiasis en equinos (tétanos)

3.5 Escaras

Unidad 3

Afecciones de la piel de los equinos, cólico equino.
principales causas
y clostridiasis en equinos (tétanos)

3.6 Vermes

Unidad 3

Afecciones de la piel de los equinos, cólico equino. principales causas y clostridiasis en equinos (tétanos)

3.7 Consumo de arena

La acumulación de arena en el tracto intestinal del caballo puede causar una variedad de signos clínicos. Retenciones de arena son comunes en caballos y ponis con acceso a suelos arenosos, especialmente si son alimentados con grano o heno suplementado de la tierra

El diagnóstico de cólico debido a la acumulación de arena puede ser difícil. La materia fecal mezclada con agua puede dar lugar a precipitado de arena en el fondo de un recipiente. El líquido peritoneal, el líquido que baña el tracto intestinal dentro del abdomen, por lo general se mantiene normal, excepto en graves casos de larga duración



La evaluación radiológica del abdomen, es especialmente útil en pequeños caballos, ponis y potros y permite en muchos casos confirmar el diagnóstico (presencia de opacidad por el mineral)

Unidad 3

Afecciones de la piel de los equinos, cólico equino. principales causas y clostridiasis en equinos (tétanos)



3.8. Ingestión de astillas de aserrín

Es conducta de comportamiento redirigido, de tipo oral que se da como consecuencia de mantener al caballo en pesebrera con raciones controladas con poca fibra y es debido a este hábito que el caballo redirige esta conducta al material de la cama (Tadich y Araya 2010)