

Nombre de alumnos: Diana Carolina Solís García

Nombre del profesor: Villafuerte Aguilar Ana Gabriela

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

Materia: Patología y técnicas quirúrgicas en equinos

Grado: 5°

Grupo: Medicina veterinaria y Zootecnia

INTRODUCCIÓN A
LAS TÉCNICAS
QUIRÚRGICAS

Unidad 3

Sarnas

La presencia de sarcoide en equinos se ha asociado fuertemente con infecciones por papilomavirus bovino

Los sarcoides son los tumores cutáneos más comunes en équidos, más frecuentes en animales menores de 4 años; afectan a ambos sexos y pueden presentarse en uno o varios individuos a la vez

Estos tumores pueden permanecer de por vida en el animal, tornándose, localmente invasivos y causar defectos cosméticos pues pueden ulcerarse e infectarse especialmente cuando se presentan en las comisuras de ojos y párpados, al afectar la visión

Fungosis

Dermatomicosis

Enfermedad infectocontagiosa. Son susceptibles muchas especies animales y el humano. Es estacional, con un periodo de incubación de 1 a 4 semanas. Es una zoonosis.

Es la infección micótica más común que presenta el potrillo al pie de la madre. Aparece en forma frecuente durante los meses más fríos del año, cuando el animal posee una cobertura abundante de pelos.

Estomatitis vesicular equina.

Enfermedad infectocontagiosa. Afecta las comisuras labiales, la lengua y los ollares. Son susceptibles los equinos, rumiantes, porcinos y humanos. Es estacional, con un periodo de incubación de 2-4 días. Es una zoonosis.

Consumo de arena

La acumulación de arena en el tracto intestinal del caballo puede causar una variedad de signos clínicos. Retenciones de arena son comunes en caballos y ponis con acceso a suelos arenosos, especialmente si son alimentados con grano o heno suplementado de la tierra