



USC

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Víctor David Dominguez Moreno

Nombre del tema: principales afecciones en porcinos

Parcial: 1er

Nombre de la Materia: patologías técnicas quirúrgicas en porcinos

Nombre del profesor: Néstor Alfaro

Nombre de la Licenciatura: MVZ

Cuatrimestre: 5to

PRINCIPALES AFECCIONES EN PORCINOS

RINITIS ATROFICA

Trastorno respiratorio

crónico

Que se caracteriza por rinitis atrófica progresiva con lesiones irreversibles cuando están presentes Bordetella bronchiseptica y P. multocida tipo D que presenta una toxina dermonecrótica.

La bacteria por sí sola puede ser causante de neumonías que cuando se combina con cepas toxigénico de Pasteurellas se empeora el cuadro clínico-lesional y es una causa importante de pérdida económica dentro de las granjas.

PASTERELOSIS

Es una enfermedad multifactorial producida por la Pasteurella multocida y la Mannheimia haemolytica.

Se conoce también como fiebre de embarque debido a su asociación con el estrés producido por el transporte de los animales.

Sx: -Fiebre, depresión, anorexia, disnea e hipernea, tos seca a húmeda, salivación profusa, rápida pérdida de peso y secreción nasal mucopurulenta.

COLIBACILOSIS

Enfermedad bacteriana causada por varias especies del género Salmonella, puede afectar a cerdos de cualquier edad.

Principalmente a los destetados (fase de crecimiento y finalización).

- Forma septicémica.
- Forma entérica aguda.
- Forma entérica crónica.

SALMONELOCIS

Puede afectar a lechones recién nacidos; a lechones entre el período neonatal al destete (diarrea de las tres semanas) a lechones después del destete (diarreas al destete o enfermedad de los edemas).

Causada por la infección de Echerichia coli enteropatógenas.

- Forma septicémica, septicemia neonatal o toxemia colibacilar.
- Colibacilosis diarreaica o diarrea colibacilar.