


UDS



MAESTRA

IAZ. Ana Gabriela Villafuerte aguilar

ALUMNA

Nelly Janeth aguilar Escobedo



MATERIA

Patología y técnicas quirúrgicas de bovinos



GRADO Y GRUPO

"A" LMVZ V



FECHA

Comitan de Domínguez chiapas a 08 de marzo del 2022




REFERENCIA

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LMV/2bbb6cde227231d7e853f545dfc56d93-LC-LMV503.pdf>



DERRIENGUE Y ENFERMEDAD DE LA VACA LOCA



DERRIENGUE

Sinonimia:
También llamada hidrofobia, derriengue. De acuerdo con la OMS/OPS la rabia es una encefalomiелitis aguda casi siempre mortal. Es la zoonosis viral conocida más antigua.

AGENTE ETIOLOGICO

Agente etiológico:
• Virus ARN de cadena negativa de la familia Rhabdoviridae, del género Lyssavirus.



SIGNOS CLINICOS

- Miedo
- Inquietud
 - Anorexia o aumento del apetito
 - Vómitos
 - Fiebre leve
 - Midriasis
 - Hipersensibilidad a estímulos.
 - Salivación excesiva
 - Cambios de temperamento

ENFERMEDAD DE LA VACA LOCA

La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) es una enfermedad fatal que ataca principalmente el Sistema Nervioso Central del ganado bovino, producida por una proteína maligna denominada PRION mediante la ingestión de harina de carne y huesos (HCH) contaminada con EEB.



ETIOLOGIA

Enfermedad infecciosa provocada por la ingestión de un agente infeccioso, denominado PRION, este está presente en alimentos concentrados derivados de rumiantes. Al ser un agente infeccioso denominado PRION que ingresa por medio de la ingestión de proteínas de origen animal, es muy difícil evitar su ingreso al organismo de animales, ya que está suplementada en una mala ración alimentaria diaria que los bovinos consumen.



SIGNOS CLINICOS

Los signos clínicos de la BSE aparecen típicamente entre los 4 y 5 años de edad como una aprehensión progresiva, hiperestesia y descoordinación del paso con una duración de 1 a 6 meses antes de la muerte. Entre 15 meses a 15 años después de la "infección" oral que ocurre generalmente a edad juvenil, de preferencia a los 4-6 años (20 meses a 18 años), comienzan muchas veces en forma insidiosa los primeros síntomas de la BSE.

