

Nombre de alumnos: Diana Carolina Solís García

Nombre del profesor: Lucía Gonzales

Nombre del trabajo: Súper nota

Materia: Patologías y Técnicas Quirúrgicas en pequeñas especies

Grado: 5°

Grupo: Medicina veterinaria y Zootecnia

ENTROPION

Es la inversión del párpado. Puede afectar a uno o los dos párpados de cada ojo y su aparición es más frecuente en el perro que en el gato.

El enrollamiento del borde palpebral origina un roce en la cornea causado por los pelos de la zona periocular, que conlleva en la mayoría de los casos a úlceras o queratitis.

Razas predisponentes

Shar pei

Chow chow

Mastin Napolitano

Dogo Alemán

Bull Dog Ingles

Cirugía de párpados

Cuando el entropión se desarrolla a partir de los 4 o 6 meses de edad generalmente necesitamos recurrir a la **cirugía**, que consiste en eliminar el trozo de piel sobrante para que los párpados no rocen la



VS

ECTROPION

Enfermedad canina en la que el párpado se desplaza hacia afuera, al contrario en el que el entropión en perros exponiendo el interior del párpado.

Una de las principales causas es genética.

Razas predisponentes

Bassentt hound

Presenta los párpados caídos y una separación del globo ocular

Causa y factores de riesgo

Primario: causado por el mal desarrollo del perro con una predisposición genética bien conocida.

Secundario: cuando es resultado de otros factores, como traumatismos, inflamación, cuerpos extraños, infecciones, ulceración corneal, parálisis de los nervios faciales, pérdida de peso y notable pérdida de tono muscular alrededor del ojo.

De esta manera los ojos se ven expuestos a agentes irritantes que pueden acabar por producir infecciones oculares o lesiones en la córnea. Además, dado que el defecto persiste, estas se hacen crónicas. Destacan las conjuntivitis recurrentes, pero, también, las inflamaciones de la córnea o queratitis. En los casos más graves, la queratitis produce ceguera.

