



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre de alumno: Luis Robles Espinosa

Nombre del profesor: Lucia Guadalupe Gonzales Santiago

Nombre del trabajo: Super nota


Materia: Patología y técnicas quirúrgicas de pequeñas especies

Grado: 5to cuatrimestre

Grupo: "A"


Comitán de Domínguez Chiapas a 22 de marzo de 2021.

Es una infección causada por un virus que es sumamente contagioso.



Afecta principalmente el tracto gastrointestinal en los perros adultos, cachorros y otros caninos salvajes.

El virus tiene afinidad por las células que se dividen rápidamente y se localiza en el intestino, la médula ósea y los tejidos linfoides.



Parvovirus de tipo 2 es una causa muy contagiosa de enteritis aguda, surgió como patógeno a finales de los años 1970, quizá debido a la mutación de una vacuna.

La transmisión ocurre por la vía fecal-oral, después de la exposición al virus en las heces o vómito o el virus que persiste en fómite.

TRATAMIENTO Terapia de sostén, no existe aún antivirales, se pueden usar terapias alternativas

Durante los primeros 2 días después de la ingestión, la replicación viral se produce en la orofaringe y el tejido local linfoide.



Los cachorros que se infectan en el útero o poco después del nacimiento pueden desarrollar miocarditis y morir de repente o desarrollar miocardiopatías si no tienen anticuerpos maternos.

