



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Victor David Dominguez Moreno

Nombre del tema: Enfermedades De Las Aves

Parcial: 1°

Nombre de la Materia: Patología Y Técnicas Quirúrgicas DE Aves Y Conejos

Nombre del profesor: Néstor Alfaro

Nombre de la Licenciatura: MVZ

Cuatrimestre: 5°

PRICIPALES ENFERMEDADES

NEWCASTLE

Enfermedad altamente contagiosa que se produce en muchas especies de aves domésticas, exóticas y salvajes; que, dependiendo de su tropismo, se caracterizan por una marcada variación de la morbilidad, tasa de muerte, síntomas y lesiones.

Los signos clínico morfológicos poseen un carácter viscerotrópico o neurotrópico. En la forma viscerotrópica, se presentan lesiones hemorrágicas diftericas, del tracto alimentario completo, del pico y del recto.

Está producida por un paramixovirus, Dependiendo de su patogenicidad, las numerosas cepas conocidas, se clasifican como lentogénicas, mesogénicas y velogénicas.

GUMBORO

Es una infección viral altamente contagiosa aguda en pollos, manifestada por inflamación y posterior atrofia de la Bolsa de Fabricio, varios grados de nefritis-nefrosis e inmunosupresión.

En pollos menores a 16 semanas de edad la IBD puede ser sub clínica pero las lesiones en la bolsa producen inmunosupresión. También puede presentarse diarrea, anorexia, depresión, plumas erizadas especialmente en la región de la cabeza y el cuello.

El virus IBD pertenece a la familia Birnaviridae del grupo de virus ARN, Se conoce que existen dos serotipos, pero solo el serotipo 1 es patogénico.

MAREK

Se caracterizan por lesiones linfomatosas nodulares difusas en varios órganos (hígado, bazo, corazón, riñones, pulmones, gónadas, proventrículos, páncreas, etc.), del músculo esquelético y de la piel. La

Se encuentra frecuentemente en aves a la edad de 8 a 9 semanas y en gallinas ponedoras. Los casos que predominan se presentan a la edad de 24-30 semanas.

Las gallinas y pollos son las aves más susceptibles a la infección y pueden desarrollar tumores, aunque los pavos, codornices y faisanes y algunas especies de aves acuáticas también son susceptibles a la infección.

COLIBASILOSIS

Afectan al sector avícola tienen gran influencia sobre los parámetros

E. coli es la especie bacteriana predominante del microbiota normal aerobia y anaerobia facultativa del aparato digestivo de la mayor parte de los animales y del hombre (Margall et al., 1997;