

**Nombre de alumno: Williams Jose Luis Cruz Cruz**

**Nombre del profesor: NESTOR  
ALFARO GUTIERREZ**

**Nombre del trabajo: mapa conceptual de la coccidiosis en aves.**

**Materia.** Patología y Técnicas Quirúrgicas de Aves y Conejos.

**Grado: 5 Grupo: A**

# Unidad 2

---

## 2.5 Coccidiosis

## Unidad 2

### 2.5 COCCIDIOSIS.

La coccidiosis aviar es una enfermedad parasitaria causada por protozoos del Phylum Apicomplexa, familia Eimeriidae. Aunque afecta a diversas especies de aves, es en el pollo de carne y gallina ponedora o reproductora, donde alcanza la mayor repercusión económica.

Clínicamente se observan heces sanguinolentas, plumas erizadas, anemia, reducción de la talla de la cabeza y somnolencia. El área alrededor de la cloaca está manchada con sangre. La infección se realiza por la ruta oral fecal.

Dependiendo de la localización de las lesiones en los intestinos, las coccidiosis son divididas en cecales, inducidas por *E. tenella*, y en el intestino delgado inducidas por *E. acervulina*, *E. máxima*, *E. necatrix*, *E. mivati*, *E. mitis*, *E. praecox*, y *E. nagani*. En la coccidiosis cecal, se presenta una marcada tiflitis con hemorragias que se observan a través de toda la pared intestinal.