



COMITAN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 7 DE ENERO DEL 2022





enfermedad altamente contagiosa que se produce en aves domésticas, exóticas y salvajes

Newcastle

se manifiesta clínicamente con ataxia, opistótomos, tortícolis, paresia y parálisis de las piernas. Esta forma se acompaña frecuentemente con síntomas respiratorios.

Se caracterizan por lesiones linfomatosas nodulares difusas en varios órganos

MAREK

Se encuentra frecuentemente en aves a la edad de 8 a 9 semanas y en gallinas ponedoras

ENFERMEDADES EN AVES

GUMBORO

es una infección viral altamente contagiosa aguda en pollos, manifestada por inflamación y posterior atrofia de la Bolsa de Fabricio

El periodo donde aparecen la mayoría de signos clínicos y la tasa más alta de muerte es a la edad de 3-6 semanas

COLIBASILOSIS

considerada como una enfermedad secundaria, originada por un estado de inmunodepresión debida a otras enfermedades víricas o bacterianas como Bronquitis Infecciosa

suele iniciarse a nivel del tracto respiratorio. Cuando E. coli atraviesa la mucosa del tracto respiratorio y alcanza el torrente circulatorio

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LMV/22305b42567e557925f6d585cd669775-LC-LMV506.pdf>