



Nombre del alumno: Roxana Daniela Perez Mendez

Nombre del profesor: Juana Inés Hernández

Materia: enfermería clínica 2

Nombre del trabajo:

Licenciatura: Enfermería

PASIÓN POR EDUCAR

Villahermosa, Tabasco. 2022

Síncope. Shock cardiogénico. Taponamiento cardiaco. Cuidados de enfermería.

El síncope es la pérdida transitoria y auto limitada del conocimiento y el tono postural por disminución del flujo sanguíneo cerebral.

El shock cardiogénico ocurre cuando el corazón ha resultado tan dañado que es incapaz de suministrarles suficiente sangre a los órganos del cuerpo.

El taponamiento cardiaco (TC) es un síndrome clínico en el que existe restricción para el llenado del corazón debido al incremento de la presión en la cavidad pericárdica por acumulación de líquido.

INTERVENCIONES ENFERMERAS:

Vigilancia estrecha de la paciente orientada a detectar signos de empeoramiento clínico:

Hipotensión importante

Cambios en el nivel de conciencia

**Aneurisma aórtico. Tipos.
Tratamiento. Cuidados de enfermería.**

Los aneurismas arteriales son dilataciones localizadas y permanentes de los vasos arteriales.

En los de pequeño tamaño, el tratamiento consiste en controlar los factores de riesgo, sobre todo la hipertensión, y realizar controles periódicos mediante ecografía o TAC

Tras finalizar la cirugía el paciente será llevado a la unidad de cuidados intensivos allí el personal de Enfermería realizará:

Monitorización de constantes

Toma de constantes: presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, presión venosa central y pulsos periféricos.

Valoración del estado de conciencia.

Isquemia arterial periférica.

