



# Mi Universidad

## Cuadro Sinoptico

*Nombre del Alumno: Anyeli Guadalupe Ordoñez Lopez*

*Nombre del tema: Terminología Obstétrica más común*

*Parcial: 2do parcial*

*Nombre de la Materia: Ginecología y Obstetricia*

*Nombre del profesor: Maria Cecilia Zamorano Rodriguez*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 5to Cuatrimestre*

*Lugar y Fecha de elaboración*

*Comitán de Domínguez, Chis. A 11/02/2022*

Terminología  
Obstetrica  
Común

2.5 Cuidados generales del recién nacido.

• Los cuidados de un recién nacido saludable, son los que se brindan en el hospital y los que se darán en caso y se agrupan con el nombre de "cuidados de rutina".

VALORACIÓN DE APGAR.

• El objetivo primordial de este trabajo es hacer explícito dichos cuidados.

VALORACIÓN DE SILVERMAN.

• Las mamas son glándulas tubo-alveolares de secreción externa.

FISIOLOGIA.

• De 15 a 20 lóbulos separados entre sí por tejido conectivo y adiposo.

MAMOGÉNESIS.

• De ellos salen 15 a 25 conductos hacia el pezón.

LACTOPOYESIS.

• Tiene venas de grueso calibre llamadas Red de Haller.

INTRODUCCION AL TRABAJO.

• Se denomina así al periodo que va desde que va inmediatamente posterior al parto hasta los 30-40 días.

Puerperio Inmediato.

• Tiempo en el que el organismo de la madre empieza a recuperarse progresivamente.

Puerperio mediato.

• Compre diferentes etapas, como son:

Puerperio Alejado.

Puerperio Tardío.

2.7 Puerperio fisiológico.

Es la primer prueba para evaluar al recién nacido y se lleva a cabo en la sala de alumbramiento.

VALORA

- Aspecto (COLOR DE LA PIEL).
- PULSO (FRECUENCIA CARDIACA)
- IRRITABILIDAD (RESPUESTA REFLEJA).
- ACTIVIDAD Y TONO MUSCULAR
- RESPIRACION (RITMO Y ESFUERZO)

El bebé debe obtener una Puntuación de 8 o superior en la prueba.

Los cinco parámetros para determinar la presencia o ausencia de dificultad respiratoria.

Se le asigna a cada parámetro un valor de 0, 1 o 2.

0 como puntaje ideal  
y 10 como el peor como DR grave.

Para que la producción de leche sea posible es necesario el desarrollo de la glándula mamaria.

CONSTA DE 4 ETAPAS:

- Mamogénesis
- Lactogénesis
- Mantenimiento de la secreción
- Eyección Lactea.

Esta a su vez se divide en 3 etapas

- Embrionario.
- Puberal.
- Gravídico.

Mantenimiento de la secreción dependiente de la prolactina.

También es dependiente del estímulo de la succión y de las demás hormonas mencionadas.

Es parecido a la Ley y Oferta y Demanda. Es decir, entre más succione el niño, habrá más producción de leche.

Procedimiento común en la práctica general de la obstetricia.

INDICACIONES

- De 6 a 10 hrs.
- 500 a 1000 ml de oxitocina
- Contracciones de 3/10min. y Barramiento al 100%.

Abarca las primeras 24 hrs. después del parto

Se extiende desde el segundo al décimo día

Concluye en torno los 40-45 do postparto

Puede alcanzar hasta los 6 meses si la madre alimenta al bebé

BIBLIOGRAFIA:

ANTOLOGIA DE ENFERMERIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA.