

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Cuadro Sinóptico

Cuidados del Recién Nacido



ALUMNA: Angela de Jesus Escobar Caballero

DOCENTE: Estela de Jesus Sánchez Jiménez

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

Parcial 1

5to Cuatrimestre

06/03/2022





Atención Inmediata

Los cuidados inmediatos son los que se realizan en la sala o cuarto de parto e incluyen el asegurarse de que la vía aérea se encuentra libre, tomar medidas para asegurarse de la buena temperatura corporal del recién nacido, pinzar y cortar el cordón, y poner al niño sobre el pecho de la madre tan pronto como sea posible

Aspiración de las secreciones de boca y nariz: Cuando sale la cabeza del bebé, el médico aspira la boca y nariz para facilitarle la respiración con ayuda de una perilla de aspiración y succión.

Sistema de puntuación de Apgar

Puntuación	0	1	2
Frecuencia cardíaca	Ausente	Menos de 100 latidos por minuto	Más de 100 latidos por minuto
Respiración	Ausente	Lenta, irregular, llanto débil	Buena; llanto fuerte
Tono muscular	Flácido	Cierta flexión de brazos y piernas	Movimiento activo
Reflejo*	Ausente	Mueca	Mueca y tos o estornudos
Color	Azulados o pálido	Cuerpo rosado; manos y pies azulados	Completamente rosado

*Reflejo evaluado colocando un catéter o una perilla succionadora en la nariz del bebé y observando su respuesta.

Pinzamiento, corte y ligadura del cordón umbilical: 5.3.1 El médico coloca al bebé con la cabeza un poco más abajo que el resto de cuerpo de la madre (para recuperar la mayor cantidad posible de sangre para el bebé) y pinza el cordón umbilical con dos pinzas colocadas más o menos a 5 cm. del abdomen del bebé y después corta el cordón entre ellas.

Cuidados de recién nacido

Es el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos dirigidos a las niñas y niños en el proceso del nacimiento.

Se efectúa en los minutos y horas que siguen al parto.

Identificación del bebé: Utilización de pulseras homologadas para este objetivo y correctamente colocadas una en el brazo y otra en el tobillo del recién nacido en la misma sala de partos, y a ser posible de distintos colores para cada parto sucesivo o simultáneo, y del mismo color para la madre que para su hijo.



Prevención del síndrome hemorrágico del recién nacido: Para prevenir posibles complicaciones en la sala de partos, se administra a todos los recién nacidos, una inyección intramuscular de 1 mg (0.1ml) de vitamina K.

Asistencia mediata



Bibliografía

[Objetivo: \(cufcd.edu.mx\)](http://cufcd.edu.mx)
