



Nombre del Alumno: IZARI YISEL PEREZ CASTRO

Nombre del tema: CUESTIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE LOS HONGOS

Parcial: 3

Nombre de la Materia: MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA

Nombre del profesor: NOE HERMINIO VAZQUEZ RECINO

Nombre de la Licenciatura: ENFERMERIA

Cuatrimestre: 2"A"

10 PREGUNTAS ABIERTAS

1. ¿Hongo con multiplicación asexual y teleomorfo es el mismo con reproducción sexual?
R= Anamorfo
2. ¿son esporas desarrolladas en una hifa previamente tabicada?
R= artrosporas o artroconidios
3. ¿es el hongo que forma los gametangios de distinta polaridad en el mismo micelio?
R= Homotálico
4. ¿Son tradicionalmente considerados como como una asociación mutualista entre hongos y especies foto autotróficas “algas, cianobacterias”, pero también pueden albergar otras comunidades microbianas?
R= Líquenes
5. ¿A otros macromicetos se los suele llamar?
R= colmenilla, costra, cuerno hediondo, estrella del campo, hígado de buey, morilla Y oreja de palo
6. ¿Cómo se distingue los macromicetos?
R= según su forma, color, olor o dehiscencia
7. ¿Cómo se llama el conjunto de filamentos de un hongo?
R= El Micelio
8. ¿Las zigosporas son formadas por?
R= conjugación gametangial
9. ¿Las esporas son los elementos de?
R= perpetuación de la especie
10. ¿Las esporas asexuales (mitosporas) son formadas por?
R= las estructuras anafóricas

PREGUNTAS DE VERDADERO O FALSO

1. Se dice prosénquima si las hifas pueden ser reconocidas y pseudoparénquima cuando han perdido su individualidad

VERDADERO FALSO

2. Holomorfo indica el ciclo de vida total

VERDADERO FALSO

3. La parte del micelio que origina y sostiene a las esporas se denomina esporóforo y si se trata de conidios se dice conidióforo

VERDADERO FALSO

4. La pared de la fiálide suele extenderse en el ápice formando un collarín

VERDADERO FALSO

5. En Penicillium cada nivel de ramificaciones recibe distinto nombre, se llama fiálides a las que sostienen a las fiálides productoras de esporas

VERDADERO FALSO

5 PREGUNTAS DE OPCION MULTIPLE

1. ¿Son las esporas sexuales internas que se originan en un número limitado “generalmente 4 u 8” dentro de una célula llamada asca?
 - a) Ascosporas
 - b) Anamorfo
 - c) El Micelio
2. ¿Son las esporas sexuales externas que se originan en el basidio?
 - a) Ascospora
 - b) Basidiosporas
 - c) Homotálico
3. ¿Los fragmobasidios divididos generalmente en?
 - a) 3 células
 - b) 8 células

c) 4 células

4. ¿Es una cadena de células votantes?

a) El pseudomicelio

b) El Micelio

c) Las anteriores

5. ¿Es un conjunto de hifas entrelazadas que se asemeja a un tejido?

a) Plecténquima

b) El pseudomicelio

c) Anamorfo