



NOMBRE DEL ALUMNO: GLADIS PEREZ RODRIGUEZ

TEMA: ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS MATERIA:

NOMBRE DEL PROFESOR: MARIO ANTONI CALDERON

CUATRIMESTRE: QUINTO CUATRIMESTRE.

FRONTERA COMALAPA CHIAPAS A 06/03/202

Enfermedades infectocontagiosas

Tosferina	Es una enfermedad (tusígena) la tos es el síntoma guía que permitirá el diagnóstico	Periodo de infección: al inicio de la fase catarral y durante los primeros 21 días Periodo de incubación: Es de 7-10 días	Prevención: La vacuna es la principal medida	Control: antibióticos, macrólidos, eritromicina, acitromicina.
Difteria	Es una enfermedad infecciosa y transmisible producida por corynebacterium diphtheriae	-Periodo de infección: es de 2-3 días -Periodo de incubación: es de 2-5 días	-Prevención: vacunación a los 2, 4, 6, con dosis de recuerdo al 4-6 años y 11-14 años	Control: hospitalización para controlar la respuesta al tratamiento
Tétanos	- Es una enfermedad aguda y desagradable inducida por una exotoxina del bacilo, tetánico el clostridium	-Periodo de infección: la infección no confiere inmunidad permanente -Periodo de incubación: es de 4-14 días tras el nacimiento media 1-7 días	Prevención: La vacunación	Control: antibióticos administrados por vía oral o por una inyección
Poliomielitis	Es una enfermedad caracterizada por una parálisis flácida asimétrica causada por los tres serotipos de virus de la poliomyelitis	-Periodo de infección: produce infección frecuente de distribución mundial todo el año -Periodo de incubación: 4-24 días en el niño vacunado	Prevención: La vacunación	Control: no existe un tratamiento médico para combatir la enfermedad
Escarlatina	Es una enfermedad exantemática infectocontagiosa se transmite de persona a persona al estornudar	-Periodo de infección: de 12 a 24 horas -Periodo de incubación: es de 3-5 días	Prevención: antibióticos que se administra durante 10 días	Control: analgésicos y antitérmicos, antibióticos
Sarampión	Es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus	-Periodo de infección: de 10-12 días -Periodo de incubación: es de 7-18 días	Prevención: vacuna sistemática	Control: No existe ningún tratamiento
Varicela	Es una enfermedad exantemática infantil muy contagiosa en los países templados	-Periodo de infección: es de 1-3 días -Periodo de incubación: 4 a 16 días	Prevención: técnica de detección, métodos biológicos	Control: se tratan en unidades de aislamiento