



Mi Universidad

Súper nota

Nombre del Alumno: Anyeli Guadalupe Ordoñez Lopez

Nombre del tema: 3.5. Fórceps: concepto. Generalidades. Requisitos. Indicaciones. Contraindicaciones. Técnica.

Parcial: 3er parcial

Nombre de la Materia: Ginecología y obstetricia I

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5to Cuatrimestre

Lugar y Fecha de elaboración

Comitán de Domínguez, Chis. A 23/02/22

3.5. Fórceps: concepto.

Los fórceps son similares a 2 grandes cucharas para ensalada. El médico las utiliza para guiar la cabeza del bebé fuera de la vía del parto. La madre empujará al bebé hacia afuera el resto del trayecto.



¿Cuándo es necesario un parto con fórceps? Incluso después de que su cuello uterino esté completamente dilatado (abierto) y usted haya estado pujando, aún puede necesitar ayuda para sacar al bebé. Las razones incluyen:

- ♣ Después de pujar por varias horas, el bebé puede estar cerca de salir, pero necesitar ayuda para atravesar la última parte de la vía del parto.
- ♣ Usted puede estar demasiado cansada para seguir pujando.
- ♣ Un problema de salud puede hacer que pujar sea peligroso para usted.
- ♣ El bebé puede estar mostrando señales de estrés y necesitar salir más rápido de lo que usted puede empujarlo por su cuenta.



¿Qué me sucederá durante un parto con fórceps? Se le dará un medicamento para bloquear el dolor. Puede ser anestesia epidural o un anestésico que se coloca en la vagina. Los fórceps se colocarán cuidadosamente sobre la cabeza del bebé. Luego, durante una contracción, se le pedirá que vuelva a pujar.

¿Cuáles son los riesgos? En su mayoría, los partos vaginales asistidos con fórceps son seguros cuando son realizados correctamente por un médico experimentado. Además, pueden reducir la necesidad de una cesárea. Sin embargo, hay algunos riesgos asociados a un parto con fórceps.

Riesgos para la madre:

- Desgarros más graves en la vagina.
- Problemas para orinar o defecar después del parto
- Para el bebé, los riesgos son:
 - ♣ Protuberancias, moretones o marcas en la cabeza o la cara del bebé.
 - ♣ La cabeza puede hincharse o estar en forma de cono.
 - ♣ Los nervios del bebé pueden resultar lesionados por la presión de los fórceps.
 - ♣ El bebé se puede cortar a causa de los fórceps y sangrar. Esto es poco común.
 - ♣ Puede haber sangrado dentro de la cabeza del bebé. Esto es más grave, pero muy poco frecuente.



BIBLIOGRAFIA:

ANTOLOGIA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA.