

3.1. Puerperio patológico. Choque séptico.

¿Qué es?

- 1.- comprende el periodo final del parto
- 2.- esta hasta la aparición de la primera menstruación
- 3.- desarrolla multitud de cambios
- 4.- cambios fisiológicos
- 5.- es cuando el cuerpo regresa al estado gravídico del cuerpo
- 6.- establece la lactancia



Patología de la lactancia.

- 1.- se recomienda la lactancia exclusiva hasta los 6 meses
- 2.- se pueden presentar dificultades
- 3.- se promueve una lactancia más precoz
- 4.- se enseña una buena técnica
- 5.- previene la formación de grietas
- 6.- previene infecciones
- 7.- El fallo de lactancia es la ausencia de producción de leche



Infección puerperal.

- 1.- es una complicación obstétrica frecuente
- 2.- requiere un diagnóstico seguro, rápido y eficaz
- 3.- precisa un tratamiento antibiótico y ocasionalmente quirúrgico
- 4.- A menudo las pacientes presentan síntomas iniciales de infección puerperal tras el alta
- 5.- asistencia en el servicio de urgencias



Endometritis puerperal



Infección en la herida quirúrgica



Mastitis puerperal

La fiebre puerperal.

- 1.- es la temperatura igual o superior a 38°
- 2.- dura entre el 2° y 10° día después del parto
- 3.- se puede deber a causas genitales y extra genitales
- 4.- la endometriosis es la principal causa



La endometriosis:

- 1.- se produce por vía ascendente tras la colonización microbiana cérvico-vaginal.
- 2.- factores de riesgo
 - 2.1.- parto por cesárea
 - 2.2.- exploraciones previas
 - 2.3.- tiempo de bolsa rota mayor de 6 horas
 - 2.4.- parto de más de 8 horas
 - 2.5.- presencia de meconio
 - 2.6.- alumbramiento manual
 - 2.7.- diabetes
 - 2.8.- corioamnionitis,
 - 2.9.- heridas
 - 2.10.- desgarro del canal de parto

