



Nombre de alumno: Ana Belen Domínguez Santiz

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano
Rodriguez

Nombre del trabajo: Resumen

Materia: Ginecología y obstetricia

Grado: 5to cuatrimestre

Grupo: LEN-B

Tumores de Ovario

Clasificación y tratamiento

Son todos los crecimientos que afectan al ovario

> Masas móviles, quísticas, pequeñas → **BENIGNAS**

> Masas fijas, Irregulares → **MALIGNAS**

Factores de riesgo.

> Antecedentes familiares de Cáncer de ovario, colon o mama

> Edad temprana de la menarquía y tardía ^{de la menopausa} temprana

> Nuliparidad > Síndrome de ovario poliquístico

> Infertilidad > Dietas con alto contenido de grasas

> Obesidad

Clasificación

Síntomas

↓
EPITELIALES
> Tumores serosos
> T. MUCINOSOS
> T. Endometrioides
> T. de células claras
> T. de Brenner

1. En la mayoría de casos no presenta síntomas o son vagos e inespecíficos

2. Pueden haber síntomas de la vejiga y recto por vecindad

3. Distensión y dolor en la parte baja del abdomen

4. Raramente con síntomas agudos

5. Casos avanzados: Ascito, metástasis
= Apéndice y/o Intestinales

De células germinales
• Teratoma
• Disgerminoma
• Tumor del saco endodérmico
• Coriocarcinoma embrionario

Representan el 20 a 25% de todos los tumores ováricos

El 3% de estos tumores son malignos

Tratamiento

Locales

Sistémicos

+

+

Cirugía

Quimioterapia

Radioterapia

> Terapia hormonal

> T/ Digital

Cáncer de Endometrio

Es un cáncer que comienza en el endometrio, el revestimiento del útero (matriz).

Causas

Un aumento en los niveles de la hormona estrógeno parece ser un factor influyente. Esto estimula la formación del revestimiento del útero y esto puede llevar a que se presente un crecimiento excesivo del endometrio.
"Ocurren 60 y 70 años de edad"

Factores relacionados con las hormonas que incrementan el riesgo de sufrir endometrio:

- > Terapia de reemplazo de estrógeno sin el uso de progesterona
- > Antecedentes de polipos endometriales
- > Obesidad
- > Periodos menstruales poco frecuentes
- > Diabetes
- > No haber estado nunca embarazada
- > Síndrome de ovario poliquístico (SOP)
- > Inicio de la menstruación a temprana edad (antes de los 12)
- > Comenzar la menopausia después de los 50
- > Tamoxifeno, fármaco de cáncer de mama

Síntomas

Sangrado Anormal de la vagina, incluyendo Sangrado entre períodos normales/marchado/sangrado después de la menopausia	Epitacios de Sangrado vaginal Frecuentes, fuertes extremadamente Prolongados → de los 40 años	Dolor abdominal
---	--	-----------------

Estadios del Cáncer Endometrial

Estadio 1 → Solo en el útero

Estadio 2 → En el útero y cuello uterino

Estadio 3 → Fuera del útero pero no más allá de la Pélvis verdadera. Puede comprometer los ganglios linfáticos en la Pélvis o cerca de la aorta (Principal del abdomen)

Estadio 4 → hacia la superficie interior del intestino, vejiga, abdomen u otros órganos

Pruebas y Exámenes

- > Biopsia Endometrial
- > Histeroscopia
- > Imágenes por resonancia magnética (IRM)
- > Histerosonografía
- > Ultrasonido

T.R.A.T.A.M.I.E.N.T.O

- > Cirugía
- > Radioterapia
- > Quimioterapia

Complicaciones

- > Anemia debido a la Pérdida de Sangre (antes del día)
- > Perforación Cervicoidal del útero. Puede ocurrir durante una dilatación y legrado o una biopsia endometrial
- > Problemas de Páiz de la Cirugía, radioterapia, Quimioterapia

Incontinencia Urinaria de esfuerzo.

Es una afección que se presenta cuando hay escape de orina y la vejiga durante una actividad física o esfuerzo. Puede ocurrir al toser, estornudar, levantar algo pesado o ejercicio.

Ocurre cuando los músculos que controlan su habilidad para contener la orina se vuelven débiles o no funcionan.

> La vejiga y la uretra están sostenidas por los músculos del piso pélvico. La orina pasa desde la vejiga a través de la uretra hacia el exterior.

> El esfínter es un músculo ubicado alrededor de la abertura de la vejiga. Conlirime para evitar que escape.

Causas	Síntomas	Pruebas y exámenes
↳ Parto	↳ Esfuerzo es el escape de orina	• Cistoscopia
↳ Lesión uretral	↳ Esto físicamente activo	• Ecografía abdominal
↳ Medicamentos	↳ Tose o estornuda	• Pruebas por microrob
↳ Cirugía Prostata o zona Pélvica	↳ Hace ejercicio	• Dicho de micción
↳ Sobrepeso	↳ se para al estar sentado	• Análisis de Orina
↳ Losas deca		• Examen de esfuerzo Urinario

> Estudios Urodinámicos para medir la Presión y Flujo de Orina

> Radiografías con medio de Contraste para examinar los riñones y la vejiga

> Urografía excretora

... Tratamiento ...

- Entrenamiento de la vejiga
- Cirugía (Colpoperineoplastia)
- Entrenamiento de los músculos del piso pélvico

... Prevención ...

- Realizar los ejercicios de Kegel (ayuda a prevenir los síntomas)
- Moverse durante y después del embarazo
- Sentado en el baño
- Apretar los músculos durante 5 seg. y relajar 10 seg. durante

