

**UNIVERSIDAD DE SURESTE
LICENCIATURA DE ENFERMERÍA
CAMPUS –COMITÁN**



MATERIA:
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

NOMBRE DEL ALUMNO:
VERA OSORIO CICLALI


NOMBRE DEL PROFESOR:
MARIA CECILIA
ZAMORANO RODRIGUEZ

NOMBRE DEL TRABAJO:
SUPER NOTA

GRUPO:


B

FECHA DE ENTREGA : 26/02/202




Distocias dinámicas

Son aquellas en las que se altera el triple gradiente descendente o el sitio de origen de la contracción uterina. Pueden ser: inversión parcial o total del triple gradiente e incoordinación uterina.



La distocia dinámica puede ser de tipo cuantitativo o cualitativo. A su turno, las distocias de tipo cuantitativo pueden ser por aumento de la actividad uterina (hiperdinamias) o por disminución de la actividad uterina (hipodinamias) (17).



BIBLIOGRAFIA

[https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/76135/9789584476180.15.pdf?sequence=21&isAllowed=y#:~:text=Distocia%20In%C3%A1mica,-La%20contractibilidad%20uterina&text=La%20distocia%20in%C3%A1mica%20puede%20ser,\(hipodinamias\)%20\(17\).](https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/76135/9789584476180.15.pdf?sequence=21&isAllowed=y#:~:text=Distocia%20In%C3%A1mica,-La%20contractibilidad%20uterina&text=La%20distocia%20in%C3%A1mica%20puede%20ser,(hipodinamias)%20(17).)