Alumno: LEONARDO LEOLID LÓPEZ PÉREZ

Profesor: MARIO ANTONIO CALDERONP

Actividad: CUADRO SINOPTICO

Materia: PATOLOGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Grado: 5°

Cuatrimestre/LEN

Grupo: "B"

Frontera Comalapa Chiapas a 30 de enero del 2022.


PADECIMIENTOS INFECTO-CONTAGIOSOS EN LOS NIÑOS
Difteria.
DESCRIPCION DE LA ENFERMEDAD
La difteria es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que puede afectar a las vías respiratorias, a la piel o puede no producir ningún síntoma
PERIODO DE INCUBACION.
El tiempo que transcurre desde que se tiene el contacto con la bacteria hasta que aparece la difteria (periodo de incubación) es de 2 a 5 días
PREVENCION Y CONTROL.
La vacuna ayuda a que el organismo produzca defensas contra la toxina diftérica Se administra combinada con la del tétanos y la de la tos ferina
Tétanos.
DESCRIPCION DE LA ENFERMEDAD
El tétanos es una enfermedad aguda y grave inducida por una exotoxina del bacilo tetánico
PERIODO DE INCUBACION
El período de incubación varía de 3 a 21 días, usualmente 8 días
PREVENCION Y CONTROL.
Las diferentes vacunas frente al tétanos son elaboradas a partir de la toxina del Clostridium tetani que es inactivada con formaldehido
Poliomielitis.
DESCRIPCION DE LA ENFERMEDAD
La poliomielitis es una enfermedad caracterizada por una parálisis fláccida asimétrica causada por los tres serotipos del virus de la poliomielitis
PERIODO DE INCUBACION
El período de incubación tras la vacunación en estos casos es:
4-24 días en el niño vacunado.
11-58 días en los contactos
Hasta 8 meses en los inmunodeprimidos.
PREVENCION Y CONTROL
No existe un tratamiento médico eficaz para combatir la enfermedad, existiendo únicamente medidas preventivas como la vacunación.
Escarlatina
DESCRIPCION DE LA ENFERMEDAD
La escarlatina en una enfermedad exantemática, infectocontagiosa, se transmite principalmente de persona a persona al estornudar o toser
PERIODO DE INCUBACION
El periodo de incubación del estreptococo beta hemolítico del grupo A, tiene un periodo de incubación de 1 a 7 días.
Sarampión.
DESCRIPCION DE LA ENFERMEDAD
El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus
PERIODO DE INFECCION
El intervalo entre la exposición al virus y la aparición del exantema oscila entre 7 y 18 días (media de 14 días).
PREVENCION Y CONTROL
No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión.
Tuberculosis
DESCRIPCION DE LA ENFERMEDAD
La infección tuberculosa es el resultado del contacto de Mycobacterium tuberculosis (MT) con un determinado individuo
PERIODO DE INCUBACION
Un 10-15% de estos individuos tienen riesgo de desarrollar enfermedad a lo largo de su vida.
PREVENCION Y CONTROL
El tratamiento de la enfermedad tuberculosa tiene como premisas fundamentales, desde el punto de vista bacteriológico, las siguientes:
Es preciso asociar varios fármacos para prevenir la aparición de resistencias. Toda monoterapia real o encubierta llevará ineludiblemente al fracaso y a la selección de resistencias.
El tratamiento tiene que ser prolongado para evitar la recidiva, en base a las distintas velocidades de crecimiento de las poblaciones bacilares coexistentes.
Hepatitis
DESCRIPCION DE LA ENFERMEDAD
La hepatitis viral es una enfermedad infecciosa del hígado causada por distintos virus y caracterizada por necrosis hepatocelular e inflamación.
PERIODO DE INCUBACION
Durante el período de incubación los pacientes permanecen asintomáticos
PREVENCION Y CONTROL