



**Mi Universidad**

## Cuadro Sinóptico

*Nombre del Alumno: Ávila Delesma Clara del Rosario.*

*Nombre del tema: Miocardiopatías.*

*Parcial: 4.*

*Nombre de la Materia: Enfermería Clínica.*

*Nombre del profesor: Lic. Selene Gabriela Sánchez Barbero*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería.*

*Cuatrimestre: 5°.*

# Miocardopatías

## Síncope

Pérdida transitoria y auto limitada del conocimiento y el tono postural por disminución del flujo sanguíneo cerebral. Puede ocurrir en forma súbita, sin advertencia, o ir precedido de síntomas presíncopales como mareos o desvanecimiento, debilidad, fatiga, náuseas, visión borrosa, zumbido en los oídos o diaforesis.

El síncope por lo común se debe a un trastorno mediado por factores neurales, hipotensión ortostática o un trastorno cardíaco subyacente. No es infrecuente que la causa sea multifactorial.

## Aneurisma Aórtico

Protuberancia que aparece en la pared del vaso sanguíneo principal (aorta) que transporta la sangre desde el corazón hacia el cuerpo. Los aneurismas aórticos pueden producirse en cualquier parte de la aorta y pueden tener forma de tubo (fusiforme) o redonda (sacular).

La causa más común del aneurisma de la aorta torácica es el endurecimiento de las arterias. La afección es más común en personas con colesterol alto, hipertensión arterial prolongada o que fuman. Otros factores de riesgo para un aneurisma torácico abarcan: Cambios causados por la edad.

## Isquemia Arterial Periférica

Resultado de la interrupción brusca del aporte sanguíneo a las extremidades como consecuencia de la obstrucción súbita de la arteria que las irriga o de un injerto implantado previamente, lo que origina una amenaza para la viabilidad de las mismas. Entre sus causas fundamentales están la embolia, la trombosis de vaso nativo o injerto, el aneurisma periférico disecante (con embolia o trombosis) y el traumatismo arterial.

Las causas principales son:

- Cardíacas. Entre las afecciones más frecuentes se encuentran la fibrilación auricular, las valvulopatías y prótesis valvulares, el infarto agudo de miocardio, los mixomas y la miocardiopatía hipertrófica y congestiva.
- Vasculares intrínsecas: pared arterial patológica con formación de trombos murales, placas ateromatosas ulceradas y aneurisma aórtico.