



**NOMBRE DE LA ALUMNA: ROXANA TOMAS DOMINGUEZ**


**NOMBRE DE LA PROFESORA: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA**

**CARRERA: LIC. EN ENFERMERIA**

**NOMBRE DEL TRABAJO: MAPA CONCEPTUAL**

**MATERIA: PATOLOGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE**

**GRADO Y GRUPO: 5 - "A"**



## ESPINA BÍFIDA

se produce cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman correctamente.

se forma en las primeras etapas del embarazo y se cierra para el día 28 después de la Concepción

La espina bífida puede ocurrir en diferentes formas: espina bífida oculta, meningocele o mielomeningocele.

Los síntomas también pueden ser diferentes en cada persona

factores de riesgo genéticos y ambientales, como antecedentes familiares de defectos del tubo neural y deficiencia de folato.

## MENINGOCELE

la columna vertebral y el conducto raquídeo no se cierran antes del nacimiento.

El mielomeningocele es un defecto del tubo neural en el cual los huesos de la columna no se forman totalmente

Meningocele, una afección en donde las meninges sobresalen por el defecto de la columna. La médula espinal permanece en su lugar.

Esta abierta o un saco lleno de líquido en la mitad de la espalda o en la parte baja de la espalda.

Posibles complicacione  
Parto traumático y dificultad para dar a luz al bebé  
Infecciones urinarias frecuentes  
Acumulación de líquido en el cerebro (hidrocefalia)  
Pérdida del control de esfínteres

## HIDROCEFALIA

El exceso de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos y ejerce presión sobre el cerebro

fluye a través de los ventrículos y cubre el cerebro y la columna

se presenta en bebés y en adultos de 60 años o más.

síntomas más frecuentes de hidrocefalia en lactantes son

Una cabeza inusualmente grande  
Un aumento rápido del tamaño de la cabeza

Enfermedades infecciosas.

ha avanzado al momento del nacimiento, puede generar importantes discapacidades físicas, intelectuales y de desarrollo.

## EPILEPSIA

provoca convulsiones o períodos de comportamiento y sensaciones inusuales, y, a veces, pérdida de la consciencia

Algunos de los signos y síntomas son

Confusión temporaria  
Un episodio de mirada fija  
Movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas  
Pérdida del conocimiento o conciencia

influencia genética  
Traumatismo de cráneo.  
Trastornos cerebrales.

Complicaciones

Caídas.  
Ahogo.  
Accidente  
Estado epiléptico.  
Muerte súbita inesperada en la epilepsia.





