



NOMBRE DEL ALUMNO: CAROLINA AVENDAÑO REYES

NOMBRE DEL PROFESOR: SILVINO DOMÍNGUEZ PÉREZ

NOMBRE DEL TRABAJO: RESUMEN

MATERIA: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

GRADO: QUINTO CUATRIMESTRE

GRUPO: 5"A"

ETAPAS DEL TRABAJO DE PARTO

1ª ETAPA

Desde el principio de los trabajos de parto hasta la dilatación completa del cuello uterino (unos 10 cm).

FASE INICIAL (LATENTE)

- ▷ Las contracciones son irregulares al principio pero se vuelven cada vez más fuertes y rítmicas.
- ▷ Las molestias son mínimas
- ▷ El cuello uterino (cervix) empieza a hacerse más delgado y se dilata aproximadamente 4 cm.
- ▷ La fase media tiene una duración media de 8 hrs (por regla general no más de 20 hrs) en un primer embarazo y de 5 hrs (por regla general no más de 12 hrs) en los embarazos posteriores.

FASE ACTIVA

- ▷ El cuello del útero se dilata por completo pasando de los 4 a los 10 cm. Se hace más delgado y se va borrando hasta que se une con el resto del útero.
- ▷ La parte que presenta al bebé por lo general la cabeza comienza a descender por la pelvis de la mujer.
- ▷ La mujer comienza a sentir la necesidad de pujar mientras el bebé desciende. Empujar demasiado pronto puede ser innecesariamente agotador y con frecuencia desgarra el cuello uterino.

► Esta fase dura de 5 a 7 horas de media en un primer embarazo y de 2 a 4 horas en los embarazos posteriores.

Etapa 1



2ª ETAPA

EL NACIMIENTO DEL BEBE

► Desde la dilatación completa del cuello uterino hasta el nacimiento del bebé:

Esta etapa suele durar aproximadamente 2 horas en un primer embarazo y aproximadamente 1 hora en embarazos posteriores. Puede durar una hora o más si la mujer ha recibido una inyección epidural o un medicamento para aliviar el dolor. Durante esta etapa, la mujer empuja.

Etapa 2




3ª ETAPA

EXPULSION DE LA PLACENTA

Desde el nacimiento del bebé hasta la expulsión de la placenta:

Esta etapa suele durar unos minutos aunque puede llegar a durar hasta 30 minutos.


Etapa 3



PLACENTA PREVIA

¿Qué es?

Complicación que se produce cuando la placenta cubre la abertura en el cuello del útero de la madre.



SINTOMAS

El síntoma principal es el sangrado vaginal de color rojo intenso sin dolor durante la segunda mitad del embarazo. La afección también puede causar una hemorragia grave antes o en el transcurso del parto.

FACTORES DE RIESGO

- ▷ Edad superior a 35 años
- ▷ Antecedentes de cirugías anteriores

TRATAMIENTO

- ▷ Se recomienda el reposo en cama
- ▷ Puede ser necesario hacer una cesárea

CUIDADO PERSONAL

Hes Abstinencia sexual y Reposo en cama

- CUIDADO DE APOYO
Hospitalización y Seguimiento de cambios o mejoras
- CIRUGIA
Cesarea
- MEDICAMENTOS
Transfusión de sangre

