



NOMBRE DE LA ALUMNA: ROXANA TOMAS DOMINGUEZ

CARRERA: LIC. EN ENFERMERIA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: RESUMEN

PASIÓN POR EDUCAR

MATERIA: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

GRADO Y GRUPO: 5 - "A"

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS 25 MARZO 2022.

PLACENTA PREVIA.

Complicación que se produce cuando la placenta cubre la abertura en el cuello del útero de la madre.

Los factores de riesgo de placenta previa incluye la edad superior a 35 años, los antecedentes de cirugías anteriores, como una cesárea, haber tenido un parto anterior o la extracción de fibromas uterinos.

Como también placenta que se desarrolla en el segmento inferior del útero y que causa hemorragias importantes durante embarazo y el parto.

SINTOMAS

El sangrado vaginal inoloro de color rojo brillante durante la segunda mitad del embarazo es el síntoma principal de placenta previa.

El útero crece puede aumentar la distancia entre el cuello uterino durante el embarazo, es menos probable que se resuelva.

Factores de riesgo:

- Tuvieron un bebé
- Tienen cicatrices en el útero
- Tuvieron placenta previa en un embarazo anterior.

MENOPAUSIA Y SUS ACCIONES.

Desaparición de la ovulación y por tanto de la menstruación y la capacidad de reproducción de la mujer: cuando es natural normalmente tiene lugar entre los 40 y los 50 años.

- Periodos irregulares: se vuelven más cortos más largos, más abundantes y ligeros. Comienza a bajarle de ven en cuando.
- calores: los calores son sensaciones de calor repetidas algunas veces intensas que suben a la cara y parte arriba del cuerpo
- Sudores nocturnos: calores que despiertan durante la noche, problemas para dormir.
- Cambios vaginales: el tejido que cubre la vagina puede volverse más delgado, más seco o menos elástico, pueda que tenga sequedad o molestias durante el sexo.
- infecciones urinarias, debilitamiento,

PRESENTACIÓN FETAL.

Describe la manera en la que está colocado el bebé para salir por el canal de parto para el alumbramiento.

La posición más deseable para el bebé dentro de su útero al momento del parto es con la cabeza hacia abajo. Se conoce como presentación cefálica.

- Esta posición hace que el paso de su bebé a través del canal del parto sea más fácil y seguro. Ocurre alrededor del 97% de los partos.
- Existen distintos tipos de presentación cefálica que depende de la posición de las extremidades y la cabeza del bebé (actitud fetal).

• Un nacimiento total de nalgas sucede cuando los glúteos se presentan primero y tanto las caderas como las rodillas están flexionadas.

• Un nacimiento de nalgas es cuando las caderas están flexionadas de manera que las piernas están derechas y completamente levantadas hacia el pecho.

Otras posiciones de nalgas ocurre cuando los pies o las rodillas se presentan primero.

