



**Nombre del alumno: Alexa Yomara
Téllez Méndez**

**Nombre del profesor: Sandra Edith
Moreno Lopez**

Licenciatura: MVZ

Materia: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

**Nombre del trabajo: INFECCIONES
PUERPERALES Y EN NEONATOS**

Ocosingo, Chiapas a 1 de abril de 2022

Infecciones Puerperales y En Neonatos

Infección Puerperal

Es una complicación postparto, una inflamación séptica, localizada o generalizada

Se produce en los primeros 15 días tras el parto

Como consecuencia de las modificaciones y heridas que la gestación y el parto causan en el canal vaginal

Esta infección era frecuentemente conocida como "Fiebre puerperal"

Fuentes de la infección postparto

Factores de riesgo

Poniendo en énfasis en uno de sus síntomas (fiebre) aunque este nombre ya no se considera adecuado para describirla

Y se opta por "Infección postparto o puerperal" que engloba otros síntomas

Altas temperaturas, durante cinco o más días después del parto

Pérdida de apetito

Flujo vaginal maloliente y diferente coloración

Vulva enrojecida

La endometritis es la fuente más común de infección postparto.

Otras fuentes de infección postparto incluyen: infecciones de la herida, cesáres, mastitis, productos retenidos a la hora del parto, infección en el tracto urinario

Los factores de riesgo que predisponen a la infección puerperal son muy variados

Factores generales: todas aquellas infecciones que disminuyen las defensas orgánicas de la hembra

Durante la gestación, la anemia, diabetes gestacional y otras enfermedades coincidentes con la gestación

También factores socioeconómicos, falta del cuidado prenatales, una mala monta,

Factores relacionados con la patología del parto: la corioamnionitis(infección de las membranas placentarias y del líquido amniótico) propicia la infección maternal ulterior

Tactos vaginales sin guantes o con guantes ya sucios, rotura prematura de membranas, maniobras exploratorias, hemorragias durante el parto, parto prolongado, desgarros en canal del parto, retención de restos placentarios

La infección suele ocurrir en el utero y causa inflamación: la causa más frecuente de infección postparto es la endometritis o inflamación del revestimiento interior del utero.

También puede haber flebotrombosis, es la inflamación de las venas del utero.

También puede afectar la vulva, el peritoneo(área entre la vagina y el recto) el cuerpo uterino o el peritoneal (membrana que cubre los órganos abdominales, peritonitis)

Cómo Afecta En Neonatos

Puede ocurrir una infección ascendente si se retrasa el parto después de la rotura de las membranas

Las infecciones que llegan a recibir es por medio del utero

En neonatos los signos y los síntomas de infección tienden a ser inespecíficos

Tuberculosis

Hepatitis

Estreptococos

Gonococos

Fiebre o hipotermia, diarrea, distensión abdominal, vómitos, pérdida de apetito

Muchas infecciones congénitas adquiridas antes del nacimiento pueden provocar diversos síntomas o alteraciones.

Limitación de crecimiento, sordera, microcefalia, anomalías, retraso de crecimiento, alteraciones neuróticas

Son propensos a ser anémicos y muy enfermizos