

ALUMNA: JUDITH LOPEZ VAZQUEZ
DOCENTE: DR. MANUEL EDUARDO LOPEZ GOMEZ

ULCERA PEPTICA

Lesiones Ulcerativas en el tracto gastrointestinal.

FISIOPATOLOGIA

Se produce en los lugares que estan expuestos al acido.

Desbalance entre los factores agresores y protectores, es el mecanismo que produce ulceraciones.

El principal causante es la infeccion por helicobacter pylori

Tambien suele aparecer por el consumo de AINES, enfermedad de Zollinger Ellison

CLASIFICACION

dos principales

LOCALIZACION

Gastrica, duodenal, esofagica, marginal.

SEGUN SU ACTIVIDAD

Lesion activa, Lesion en fase de cicatrizacion, cicatriz de ulcera (blanca o roja)

Se puede subclasificar:

ej: Ulcera P. Gastrica Activa, Ulcera P. Duodenal en fase de cicatrizacion, etc.

PRESENCIA CLINICA

Dolor epigastrico que despierta en la madrugada, se atenua con la ingesta de comidas. nauseas, meteorismo.

TRATAMIENTO:

consta en sanar la lesion y prevenir complicaciones:

promover el cese en consumo de alcohol, tabaco, uso adecuado de AINES

- TRIPLE TERAPIA PARA ERRADICAR H. PYLORI.
- ANTIACIDOS.
- ANTIHISTAMINICOS
- PROSTAGLANDINAS

FACTORES DE RIEZGO

- Personas mayores de 60 años con historial previo de UP,
- Padeedores de enfermedades cardiacas, del riñon o hígado.
- Personas que consumen anticoagulantes
- Consumidores de alcohol y tabaco.

COMPLICACIONES

- HEMORRAGIA
- PERFORACION
- OBSTRUCCION.

FUENTE DE INFORMACION:
REVISTA MEDICA DE COSTA RICA;
"GASTROENTEROLOGIA- ULCERA PEPTICA".
JOSE ENRIQUE CAMACHO MORA.