

# FISIOPATOLOGIA

**TEMA:** COLESTASIS, PANCREATITIS Y LITIASIS BILIAR

**Alumna:** Ingrid Renata López Fino

**Docente:** Dr. Manuel Eduardo López Gómez

Parcial: 3

Semestre: 2

# COLESTASIS

Es:  
**Detención del flujo biliar, que impide de forma parcial o total la llegada de bilis al duodeno, asociada a la regurgitación de sus componentes a la sangre.**

## INTRAHEPÁTICAS

### Hepatocitos

Las lesiones...  
**Pueden ser globales o afectar a estructuras subcelulares concretas.**

### Espacios porta

La obstrucción  
**Aparece en presencia de granulomas o metástasis de neoplasias.**

## EXTRAHEPÁTICAS

**Obstrucción de los conductos biliares situados fuera del hígado (hepático y colédoco)**

### Intraluminales

Se debe a:  
**Cálculos biliares, formados en la vesícula biliar o, en la propia vía biliar**

### Parietales

Se debe a:  
**Tumores y las cicatrices retráctiles.**

### Extraparietales

Se debe a:  
**Adenopatías, enfermedad s pancreáticas o carcinoma de vesícula.**

## MIXTAS


**Aparece característicamente en la colangitis esclerosante primaria**

### Colestasis hepatocelulares

### Colestasis «descendentes»

### Colestasis «ascendentes»

Manifestaciones clínicas  
**Hepatomegalia, dilatación de las vías biliares por encima del obstáculo e Infección**



# PANCREATITIS

Es:

Inflamación del páncreas

Puede ser:

AGUDA

Cuando:


Ocurre de repente y generalmente desaparece en pocos días con tratamiento

La causa más común:

Cálculos biliares

Síntomas:

- Dolor intenso en la parte superior del abdomen
- Náuseas
- Vómitos



Puede ser:

CRONICA

Cuando:

No se cura o mejora; Empeora con el tiempo y lleva a daño permanente

La causa más común:

Consumo excesivo de alcohol

Síntomas:

- Náuseas
- Vómitos
- Pérdida de peso
- Heces grasosas

Otras causas:

Fibrosis quística, grandes cantidades de calcio o grasa en la sangre, algunos medicamentos y enfermedades autoinmunes

Síntomas:

# LITIASIS BILIAR

Es:


Existencia de cálculos dentro de la vesícula biliar

Se divide en:

**LITIASIS DE COLESTEROL**

Supone el 75% de las litiasis biliares en los países occidentales

Además...



ADAM.

Se divide en:

**LITIASIS PIGMENTARIA**

Supone el 25% restante

Además...

El cuadro clínico típico de la litiasis biliar es el cólico biliar

Síntomas:

- Dolor intenso en lado derecho del abdomen.
- Vómitos.
- Nauseas.

## BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA		
TIPO	TITULO	ENLACE
Libro PDF	Sisinio de Castro. Manual de Patología General CAPITULO 41: Ictericia y colestasis	<a href="#">Manual de Patología General by Jose Luis Perez Arellano (z-lib.org).pdf</a>
Página web	Pancreatitis	<a href="https://medlineplus.gov/spanish/pancreatitis.html">https://medlineplus.gov/spanish/pancreatitis.html</a>
Página web	Litiasis biliar	<a href="https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/litiasis-biliar#:~:text=La%20litiasis%20biliar%20o%20colelitiasis,al%20duodeno%20durante%20la%20digesti%C3%B3n.">https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/litiasis-biliar#:~:text=La%20litiasis%20biliar%20o%20colelitiasis,al%20duodeno%20durante%20la%20digesti%C3%B3n.</a>