

CANDIDIASIS

ENFERMEDADES INFECCIOSAS




¿Qué es?

es una afección cutánea consecuencia de parasitación de "hongos". Infección fúngica ocasionada por el hongo *Cándida* que se presenta generalmente en la piel o las membranas mucosas.

Agente infeccioso

El agente patógeno de las candidiasis mucocutáneas es la *Candida albicans*. La *Candida albicans*, que cuando se encuentra en la piel es agente etiológico de una candidiasis primaria.



Sintomas

FORMAS CIRCUNSCRITAS: muguet oral, intertrigo acndidiasico, onixis.

FORMAS DISEMINADAS Y PROFUNDAS: candidiasis mucocutanea crónica, granuloma candidiasico, vulvovaginitis, balanitis, candiduria.

FORMAS SITEMICAS: septicemia por candida (candidemia), candidemia iatrogenica, dermatitis fungica invasora.

Dx.

El diagnóstico de la candidiasis es fundamentalmente clínico, aunque en ocasiones es necesario apoyarse en un examen directo de las escamas o en un cultivo micológico.



Tx.

Miconazol, clotrimazol, ketoconazol, en forma tópica dan muy buenos resultados en los intertrigos candidiasicos, en las onixis y en general en las lesiones cutáneas. Tomar un medicamento antimicótico durante tres a siete días por lo general alivia una infección por candidosis vaginal. Los medicamentos antimicóticos, que están disponibles en forma de cremas, ungüentos, comprimidos y supositorios, incluyen miconazol (Monistat 3) y terconazol.

MARIA DEL PILAR CASTRO PÉREZ