
COCCIDIOIDOMICOSIS



ROLANDO DE JESUS PEREZ MENDOZA

DRA KATYA PAOLA MARTINEZ LOPEZ

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

SUPER NOTA COCCIDIOIDOMICOSIS

MEDICINA HUMANA

UDS UNIVERSIDAD DEL SURESTE

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS

27 DE MAYO DEL 2022

Coccidioidomicosis

El Coccidioides se encuentra en el polvo y los suelos de algunas áreas del suroeste de los Estados Unidos, México y América del Sur. En los Estados Unidos, el Coccidioides se encuentra en Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Texas y Utah. El hongo también se encontró recientemente en la zona sur central de Washington

Estos mapas muestran las estimaciones actuales de los CDC sobre dónde viven en el ambiente los hongos que causan la coccidioidomicosis o fiebre del valle (fiebre del valle de San Joaquín). Estos hongos no están distribuidos uniformemente en las áreas sombreadas, puede que no estén presentes a todo lo largo de las áreas sombreadas y también pueden estar presentes afuera de las áreas sombreadas.



La fiebre del valle, también llamada coccidioidomicosis, es una infección causada por el hongo Coccidioides. Se sabe que el hongo vive en los suelos del suroeste de los Estados Unidos y en zonas de México, América Central y América del Sur



Los síntomas de la fiebre del valle incluyen los siguientes:

Fatiga (cansancio)

Tos

Fiebre

Falta de aire

Dolor de cabeza

Sudores nocturnos


Dolores musculares o dolor en las articulaciones

Erupción en la parte superior del cuerpo o en las piernas



¿Cuánto tiempo duran los síntomas?

Los síntomas de la fiebre del valle generalmente duran desde unas pocas semanas hasta unos meses, Pero algunos pacientes tienen síntomas que pueden llegar a durar más tiempo, especialmente si la infección empeora.



Para muchas personas, los síntomas de la fiebre del valle se van en unos pocos meses sin ningún tratamiento. Los proveedores de atención médica eligen recetar antimicóticos para algunas personas como forma de reducir la intensidad de los síntomas o prevenir que la infección empeore. Los antimicóticos en general se le dan a las personas con riesgo más alto de presentar fiebre del valle grave. En general, el tratamiento consiste en tomar fluconazol u otro tipo de antimicótico durante 3 a 6 meses. No existen medicamentos de venta sin receta médica para tratar la fiebre del valle. Si tiene fiebre del valle, debe consultar a su proveedor de atención médica para saber si necesita tratamiento. Es posible que el médico que determine el diagnóstico de fiebre del valle, le indique consultar a otros profesionales de la salud especializados en el tratamiento de la fiebre del valle