

OBESIDAD

Agente: Alimentos
 hipercalemia, anticonceptivos,
 hipertriglicidemia, anti-
 hipertensivos, anti-septicos
 síndrome cushing

Ambiente: Falta de
 espacios adecuados
 para ser ejercidos
 vent de caminar en la
 calle.

Atípico: Sedentismo,
 menopausia, postmenopausia
 tabaquismo, uso
 de automovil

Periodo Prepatológico

- Peso corporal

Prevencción
 Primaria
 Prevencción y corrección
 de la obesidad
 tabaquismo
 estos
 sende termino.

acumulación anormal o excesiva de grasa corporal,
 Daño celular, mutación de adipocitos, acumulación corporal
 Daño físico: hipertrofia de adipocitos
 Daño orgánico: obesidad central
 Daño sistémico: diabetes tipo 2 e insulina

Croneidad: Diabetes mellitus 2, ateroclerótica, enfermedad biliar,
 síndrome ovario poliquístico, cáncer, muerte súbita
 Curación: No remite cambio en el estilo de vida.

Periodo Pato Genico

Prevencción Secundaria
 No farmacológica - dieta
 baja en grasas, ejercicio individualizado.
 Farmacológico - leptina, ferretina
 morbidos

Prevencción
 terciaria
 Peso ideal
 en tener un peso
 adecuado
 durante la vida.

Envenenamientos

Agente: Veneno de origen animal, vegetal o mineral

Ambiente: Zonas endémicas animales, Puzos y Puzos venenosos y residuos tóxicos

Respuesta: Frecuentemente una respuesta de hipersensibilidad al veneno

Periodo: Prepatogénico

Defensa: naturales contra sustancias tóxicas

Prevenición: Primarias
Evitar que personas no capacitadas manejen sustancias tóxicas

a cualquier sistema líquido, sólido o gaseoso que por acción química puede causar daño al organismo.

Daño celular: Veneno daña la célula por diversos mecanismos.
Daño tisular: Por contacto o absorción en la puerta de entrada

Daño orgánico: Distribución del organismo afectado el órgano

Daño sistémico: Afecta de pulmón, corazón, riñón

Conocimiento: elimina el agente tóxico o se conjuga

Curación: Manejo adecuado puede revertir el proceso dependiente del tóxico

Periodo: Patogénico

Prevenición: Secundarias

Cambios de estado de conciencia, disnea, vomito diarrea, micción dolor abdominal soporte respiratorio, lavado gástrico

Prevenición terciaria
Tratamientos posibles, Secuelas Reducidas, por el envenenamiento

Diarrea

Agente: Viral: rotavirus

Bacteriana: Shigella, Shigamella

Fungi: Staphylococcus
Parvato: Giardia lamblia

Ambiente: Inadecuada
Preparación de alimentos

Agua sucia,
Fecalismo o al aire libre
Alimentación sucia

Presepa: No respeto, educar
o género
• No lavarse las manos
o Higiene inadecuada

Periodo Patogenico

Intestino

Prevenccion Primaria

- Desinfeccion adecuada de los alimentos
- Correcto uso de las manos
- Dieta balanceada,

Entimedad caracterizada por el aumento en la cantidad de agua y electrolitos en las heces.

Daño celular: Alteracion en el citoesqueleto

Daño Organico: funcionamiento incorrecto de los mecanismos de transporte

Daño sistémico: Deshidratación, desequilibrio electrolítico, convulsiones, resquebraje intestinal.

Cronocidad: la diarrea presente por cuatro o más semanas de los centros de salud.

Curación: diarrea autolimitada las medidas terapéuticas

Daño físlar: se extiende en el epitelio gusto intestinal por mensajeros secundarios

Periodo Patogenico

Prevenccion Secundaria

Diarrea acuosa: dolor abdominal tipo cólico, vómito, distension abdominal

Diarrea con sangre: frotor cefálico anorexia y debilidad general

Prevenccion Terciaria

- Mantener una higiene adecuada en el laboratorio
- Dieta balanceada,
- Vigilancia

CIRROSIS

Estado final de las enfermedades hepáticas crónicas progresivas

Baño celular: los hepatocitos y las células parenquimales

Dañó físcular: burlillos hepáticos

Dañó orgánico: inflamación

Dañó sistémico y muerte encefalopática y coma, retención hídrica, hemorragias crónicas, lesión crónica, aumento de los días de evolución curación: se considera en estadíos iniciales de tratamiento

Agente: Ingesta de alcohol, nutrición hipercalórica - Protea, toxicina de ~~farmacos~~ y drogas
 • virus hepatitis B, C, D.

Ambiente: Alimentación grasa, alcoholismo, drogadicción
 Predisicidial

Husped: No respeta género
 Drogas, Alta ingesta de alcohol, obesidad.

Periodo Prepatogénico

• Daño al hígado

Prevenición Primaria

- Moderación o abstinencia del consumo de alcohol
- Dieta balanceada
- Facto sexual Seguro y Protgido
- Evitar Predisicidial

Periodo Pato génico

Prevenición Secundaria

- Anorexia, Vómito, diarrea, dolor vaginal en el cuadrante Superior
- Fatiga, Fiebre
- TAC.
- De origen viral - antiviral
- Marcadores virales

Prevenición terciaria

- Dieta balanceada
- Sin ingesta excesiva de proteínas y calorías

Apéndice

Agente: Presencia de fecalitos o microplasma de folículos linfoides

Ambiente: Hacinamiento, condiciones de mala vivienda, alimentación grasosa y alcoholismo

Hábitos: No respetar género, higiene inadecuada, lavado de manos

Periodo Pre Patogénico

- contiene folículos linfoides

Prevención Primaria

- Moderar el consumo de alcohol
- Dieta balanceada
- lavado de manos
- Control Sanitario en alimentos

Inflamación del apéndice cecal o vermiforme que lleva a una destrucción de la luz apendicular.

Daño celular: la célula dañada produce inflamación

Daño físico: Se extiende a partir de la mucosa hasta el resto del tejido.

Daño orgánico: distensión y aumento de la presión de la pared apendicular

Daño sistémico: infección, respuesta inflamatoria

Cronicidad: perforación peritonitis generalizada

Curación: Necesita tratamiento o cirugía

Periodo Patogénico

Prevención Secundaria

escala Mc Burney Positivo
Signo de obturador y
Pruebas Positivo

Prevención terciaria

- Los juicios de faciente sobre síntomas tempranos
- Infección de la herida
- Absceso residual