

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

Dolor

Es un fenómeno subjetivo que depende de la experiencia y de la percepción.

El dolor puede ser agudo o crónico, dependiendo de su duración y de su intensidad.

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

Experiencia del dolor

Depende de la experiencia y de la percepción.

El dolor puede ser agudo o crónico, dependiendo de su duración y de su intensidad.

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

Neurofisiología del dolor

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

El dolor puede ser agudo o crónico, dependiendo de su duración y de su intensidad.

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

Tipología del dolor

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

El dolor puede ser agudo o crónico, dependiendo de su duración y de su intensidad.

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

Teoría de la puerta del dolor

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

El dolor puede ser agudo o crónico, dependiendo de su duración y de su intensidad.

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

Receptores del dolor

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

El dolor puede ser agudo o crónico, dependiendo de su duración y de su intensidad.

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

Fibras Aδ

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

El dolor puede ser agudo o crónico, dependiendo de su duración y de su intensidad.

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

Dolor rápido

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

El dolor puede ser agudo o crónico, dependiendo de su duración y de su intensidad.

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

Dolor de onda lenta

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

El dolor puede ser agudo o crónico, dependiendo de su duración y de su intensidad.

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

Fibras C

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

El dolor puede ser agudo o crónico, dependiendo de su duración y de su intensidad.

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

La vía para el dolor lento

El dolor puede ser causado por una lesión o por un estímulo que activa los receptores del dolor.

El dolor puede ser agudo o crónico, dependiendo de su duración y de su intensidad.