

Gripe

La tasa de incidencia de GRIPE en la semana 05/1015 casos por 100,000 habitantes

ANIBEL GRIPE
La tasa de incidencia de GRIPE durante Semana 05 supera el umbral de los establecimientos en esta temporada.

La incidencia global de GRIPE en la temporada 2014-2015 fue muy moderada y se asoció con una circulación moderada

Se le considera como una infección viral común que también puede ser mortal especialmente en el grupo de alto riesgo

Su periodo epidémico tuvo una duración de diez semanas y se situó en el rango de las semanas de las temporadas de GRIPE tempranas

Se registraron 14 brotes de GRIPE en ocho en países como Lanzarote, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y País Vasco.

TOTAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EL 54% FUERON HOMBRES Y LA MEDIANA EDAD FUE DE 69 AÑOS

Afecta (o pulmones), LARINGE Y GARGANTA DE LO MÁS PROFUNDO HACIA DE COMO AVANZADA

Su nivel de intensidad se consideró moderado con respecto a las temporadas tempranas

VIGILANCIA DE DEFUNCIÓN

DURANTE LA TEMPORADA 2014-2015 PRINCIPALES EN LA VIGILANCIA 90 HOSPITALES DE 4 a 16 POR CADA AUTÓNOMA CON SUA POBLACION VIGILADA.

MORTALIDAD RELACIONADA CON LA GRIPE

SE REGISTRARON 262 DEFUNCIÓN ENTRE CASOS GRIPE HOSPITALIZADOS CONTINUANDO DE GRIPE LA LETALIDAD DE LA INFECCIÓN GRIPE DE GRIPE FUE DE 15.7% ENTRE LOS CASOS HOSPITALIZADOS.

Los síntomas incluyen fiebre escarlatina, dolor muscular tos, congestión, secreción nasal dolor de cabeza y fatiga

INFORMACION VIROLÓGICA

SE IDENTIFICARON UN TOTAL DE 8,785 DETECCIÓN DE VIRUS DE LA GRIPE DE LOS CUALES 32% DE FUENTES SCINTILACTAS Y 68% DE FUENTES NO SCINTILACTAS

DURANTE ESTA TEMPORADA SE ANALIZARON PORCENTAJES DE MUESTRAS POSITIVAS A VIRUS GRIPE LA CUAL AUMENTO CONTINUANDO DESDE LA SEMANA 50/2014 (LA CUAL ALCANZO LA MÁXIMA TASA DE DETECCIÓN)

La especificación de la vacuna se ha elaborado por el estudio de casos y control retrospectivo en el que los casos son solo de virus GRIPE con firmados por laboratorio

Se trata principalmente con descanso y líquidos para que el cuerpo pueda combatir la infección

Salmonelosis

Se dispone de la
Tendencia sobre
Sexo en 9, 0,39
Caso)

Transmisión
Vertical en 2013
De los nuevos partos
De la reproducción
De un millón entre
matrónas

epidemiología

Infección provocada por la ingestión
de la salmonela usualmente
Obligada por la ingestión de la
Alimento o agua contaminados

Es de transmisión alimentaria (publicar
con datos de 2015 en Europa más
Serotipo enteritidis continúa más frecuente
Por otro lado mientras que la Unión Europea
PMO serotipo experimental un descenso
en los últimos años.

La etiología de los casos causados
por salmonela enteritidis se nota más
en el mes de verano y otoño

Es más común entre niños los
Personas con sistema inmune
deprimido como los niños de
una familia

La salmonelosis es la segunda
causa de gastroenteritis bacteriana
en España y continúa representando
in primario causa de bacterias

Los síntomas incluyen diarrea, fiebre
Escalofríos y dolor abdominal

Los principales serotipos encontrados
Al igual que la Unión Europea aunque según
el último informe de entomología

La mayoría de los pacientes solo se
reciben líquidos para rehidratación
en caso de una salmonela la infección
graves pueden requerir antibióticos