



## TRATAMIENTO

### Con SALISILATOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS

El ácido acetilsalicílico es el fármaco más indicado, en dosis de 50 a 60 mg/kg de peso al día hasta un máximo de 80 a 100 mg/kg al día (4 a 8 g/día en adultos) en cuatro a cinco fracciones

### TRATAMIENTO CON ANTIBIOTICOS


- Deben de recibir antibióticos contra estreptococo del grupo A  
Las PENICILINAS son de elección  
fenoximetilpenicilina, 500 mg [250 mg para niños <27 kg] VO c/12 h,  
amoxicilina, 50 mg/kg [ máximo 1 g] por día durante 10 días

# FIEBRE REUMATICA



## MANIFESTACIONES CLINICAS

- Faringitis previamente
- Poliartritis
- Carditis
- Corea
- Eritema Marginal
- Nodulos subcutaneos
- Fiebre



## FACTORES RELACIONADOS CON EL MICROORGANISMO

Infección de vías respiratorias superiores por estreptococos del grupo A

## FACTORES RELACIONADOS CON EL HOSPEDADOR

- 1.- Gemelos monocigotos
- 2.- Al parecer, algunos alelos de clase 11 del antígeno leucocítico humano
- 3.- Polimorfismos en el locus del factor de necrosis tumoral (TNF--a-308 y TNF-a-238)