
AINES
ENDOLAC
FARMACODINAMIA
Es una
Inhibidor de la COX
REACCIONES ADVERSAS
Estas pueden ser
- Alteraciones gastrointestinales
- Ulcera peptica
CONTRAINDICACIONES
°Ulceras gastroduodenales
Hipersensibilidad al compuesto.
FARMACOCINETICA
SITIO DE ABSORCION
Tubo Digestivo
SITIOS DE ADMINISTRACION
- Via oral
- Via Paarenteral
SITIO DE METABOLISMO
Higado
VIA DE ELIMINACION
- Orina
- Heces
INDICACIONES, DOSIS Y PRESENTACION
INDICACIONES
°Aliviar dolor leve a moderado
°Artritis reumatoide
°Osteoartritis
DOSIS
200 a 300 mg dos veces al día
PRESENTACION
cápsulas de 200 y 300 mg
ampolletas de 100 mg.
CELOCOXIB
FARMACODINAMIA
Inhibidor de la COX2
INDICACIONES, DOSIS Y PRESENTACION
INDICACIONES
1.Artrosis
2.Poliartritis reumatoide
3.Espondilitis anquilosante
DOSIS
200 mg una vez al día o fraccionada en dos dosis con los alimentos.
PRESENTACION
Cápsulas de 100 y 200 mg
REACCIONES ADVERSAS
Dolor abdominal
Diarrea
Vómito
Dispepsia
Erupción cutánea
FARMACOCINETICA
VIA DE ELIMINACION
Orina y heces
SITIO DE METABOLISMO
Higado
SITIO DE ABSORCION
Tubo Digestivo
VIA DE ADMINISTRACION
Via oral
CONTRAINDICACIONES
Son
- Pacientes alergicos a las ulfas
- Pacientes con crisis asmaticas
- Hipersensibles al comúesto
PIROXICAM
FARMACODINAMIA
Es un
Inhibidor de la cox
FARMACOCINETICA
Su administración es oral
Las concentraciones plasmáticas se alcanzan después de 2 a 4 horas. Su vida media es de 50 horas. Es metabolizado en plasma e hígado y eliminado por orina y heces
INDICACIONES, DOSIS Y PRESENTACION
INDICACIONES
1.-Trastornos musculoesqueléticos agudos,
2.-Gota aguda
3.-dolor posquirúrgico
4.-Dismenorrea
Manejo crónico de la artritis reumatoide y la osteoartritis.
DOSIS
20 mg una vez al día
PRESENTACION
CAPSULAS 10 y 20 mg
REACCIONES ADVERSAS
Son
- Alteraciones Gastrointestinales
- Ulcera peptica
CONTRAINDICACIONES
son
1.-Hipersensibildad
2.- Ulcera peptica