

Colecistitis



1




Inflamación de la vesícula biliar, un pequeño órgano digestivo ubicado detrás del hígado.

2



La colecistitis es ocasionada por cálculos que obstruyen el tubo que conecta la vesícula biliar con el intestino delgado

3



Algunos de los síntomas son el dolor intenso en la parte superior derecha del vientre y la hinchazón.

4



Se trata con antibióticos, mejor alimentación

5



Colegammagrafía

6



Con el paciente en ayunas, se inyecta por vía intravenosa un compuesto iminodiacético marcado con tecnecio. En la colecistitis litiasica aguda, que suele ser secundaria al impacto de un cálculo en el conducto cístico, la vesícula biliar no aparece en la gammagrafía porque el radionúclido no puede ingresar en ella. Esta falta de visualización permite obtener un diagnóstico bastante exacto (excepto los resultados falsos positivos en algunos pacientes en estado crítico).

ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL

1



Ensanchamiento de la aorta, el vaso sanguíneo principal que suministra sangre al cuerpo, a nivel del abdomen.

El aneurisma de aorta abdominal (AAA) puede ser mortal en el caso de una ruptura. El aneurisma de aorta abdominal es más común en hombres de edad avanzada y fumadores

2

El dolor en la espalda, el vientre o los costados pueden ser síntomas de una ruptura inminente.

3

Dejar de fumar puede ralentizar el crecimiento. Los más pequeños solamente necesitan control periódico. Los aneurismas que son muy grandes o que crecen demasiado rápido se deben tratar con cirugía.

4

el cribado de AAA mediante ecografía abdominal, excluiría al sujeto con un futuro AAA de las complicaciones graves derivadas del mismo

5