


Infecciones de las vías respiratorias superiores

- La transmisión de los virus patógenos causantes del resfriado común puede producirse por contacto directo y por partículas de aerosol grandes o pegueñas.

- El resfriado común afecta 5-7 veces al año a los niños y 2-3 veces al año a los adultos.
- Los resfriados se producen con más frecuencia entre el principio del otoño y el final de la primavera en climas templados.

Epidemiología



Resfriado común

Definición

- El resfriado común es una enfermedad de las vías respiratorias altas cuyos síntomas principales son obstrucción nasal y rinorrea.

Faringitis

• La faringitis se define como la tríada de dolor de garganta, fiebre e inflamación faríngea.

Epidemiología

• La enfermedad predomina en los niños y en los adultos jóvenes, con un 50% de casos entre los 5 y los 24 años.

Microbiología

• El Streptococcus del grupo A (SGA) es la causa bacteriana de la que existe una información

Definición

• Aunque suele ser una enfermedad primaria, la faringitis puede estar asociada a enfermedades sistémicas.

• La faringitis es una de las enfermedades más frecuentes en adultos y en niños, con más de 10 millones de consultas médicas al año.

• En climas templados la mayoría de los casos aparecen en los meses de invierno, coincidiendo con las concentraciones máximas de virus respiratorios.


• Los virus son la causa más frecuente de faringitis, con predominio de los adenovirus.

Laringitis aguda

Microbiología

- Un 2% de las personas con síntomas respiratorios agudos se diagnostican de laringitis aguda.

- Alrededor del 1 % de las consultas médicas se deben a disfonía, con el 42% de éstas clasificadas como laringitis aguda.




Definición

- La laringitis aguda es un síndrome clínico caracterizado por una voz ronca con disminución de la fonación y de la proyección de la voz, por lo general después de una infección de las vías respiratorias superiores con tos.

Epidemiología

Crup en la infancia (laringotraqueobronquitis aguda)



Otitis externa, otitis media, y mastoiditis

DEFINICIÓN

• La mastoiditis es una infección e inflamación de las celdas aéreas mastoideas y suele ser consecuencia de episodios OMA grave.

Mastoiditis

• La otitis media aguda (OMA) es una enfermedad aguda marcada por la presencia de líquido en el oído medio y de inflamación del revestimiento mucoso del espacio del oído medio. El líquido puede persistir en el oído medio durante semanas a meses después de una OMA con tratamiento apropiado y se denomina otitis media con derrame.

Otitis media

Otitis externa

• La otitis externa es una infección e inflamación del conducto auditivo externo.

Sinusitis

