

Helminthiasis

Pueden ser monoxenos o heteroxenos segun su ciclo vital en una o mas hospedadores

El hombre puede ser hospedador de las formas larvales

Platelmintos

Nematodos

Forman el grupo mas primitivo de helmintos, tienen forma aplanada y presentan ganchos por quien como organos

Son helmintos de forma cilindrica fusiforme o filiforme no segmentados, de tamaño variable

inuyen dos subgrupos los cuales son fascioloideas y esquistosomas

Hay diversas clases de nematodos parásitos del hombre.

Tienen separacion de sexos

En patología la helmintiasis puede ser localizada en la luz intestinal o en organos profundos segun el parásito

Se localizan especialmente en venidas en que el macho envuelve a la hembra formando una configuración filiforme

Para el diagnostico se basan en la observación macroscópica del parásito eliminado con las heces

evolucionan huevos de morfología diferente segun el verme

~~27-06-22~~



Cestodos


Son helmintos planos acintados y segmentados con una cabeza denominada escólex en la que existen ganchos o ventosas que se fijan en la pared del tubo digestivo

Por desgracia su ciclo vital, además del hospedador definitivo

comprende la patología causada una tenia al hombre para saber si es el hospedador definitivo

La parasitación intestinal

Por estas tenias no producen signos clínicos o son muy ligeros.



Se observó directamente en 1951 veres los fragmentos del cuerpo de la tenia

tiene como hospedador definitivo los cerdos, en cuyo tubo digestivo se halla la tenia adulta.

