

Todas las infecciones fúngicas en la piel son patologías tipo benignas, que no suelen ocasionar algún riesgo para la vida del paciente. El calor, la humedad y una higiene que no se realiza adecuadamente provocan una mayor incidencia de este tipo de micosis, y con esto hay un aumento del número de consultas médicas y farmacéuticas por lo que se requiere una atención especial.

Dermatofitosis o tiñas

Son un tipo de micosis cutáneas causadas por hongos filamentosos que presentan afinidad por tejidos en cuya composición figure la queratina y que tienen una gran adaptabilidad. Los agentes causales más comunes son dermatofitos del género *Microsporum* y *Trichophyton*, y son capaces de infectar partes del cuerpo cubiertas, uñas y pestañas causando áreas alopecias, prurito y lesiones antiestéticas de tipo crónicas, escamosas e inflamatorias.

Los especies de hongos que pueden intervenir en las tiñas del cuerpo pueden ser muy diversas, aunque en nuestro país, los agentes patógenos más comunes responsables de esta infección

Candidiasis intertriginosa

Es un tipo de infección micótica producida por candida albicans que suele afectar las zonas de la piel que forman los pliegues cutáneos que son axilas, inguinal, mamario, submamario, intergluteo de la boca y puede afectar en alguno de estos casos al esófago, a una faringitis candidiaca.

Next Dude 