

Helminthosis

Pueden ser monoaxenas o heteroxenas segun su ciclo vital en uno o mas hospedadores.

El hombre puede ser hospedador de las formas liquidas.

Platelmintos

Nematodos

Forman el grupo mas primitivo de helmintos, tienen formas aplanadas y presentan ganchos que actuan como organos.

Son helmintos de formas cilindricas fusiforme o filiformes, no segmentaria de termino variable.

Incluyen dos subgrupos los cuales son foscilopidos y esquistosomas.

Hay clases diferentes de Nematodos adaptos del hombre.

Tienen separacion de sexos.

Se localizan estrechamente en vertebros en que el macho envuelve a la hembra con sus uncinaciones filiformes.

En Patologia la helmintosis puede ser localizada en la luz intestinal o en organos profundos segun el paraisito.

Producen huevos de morfologia diferente segun el verme.

En el diagnostico se basan en la observacion macroscopica del paraisito mezclados con los heces.

Cestodos

Son vermicintos planos acilados y segmentados con una cabecera denominada escolex en la que existen ganchos o ventosas que se fijan en la pared del tubo digestivo.

Para desarrollar su ciclo vital, además del hospedador definitivo.

Comprender la patología causada en el hombre para saber si es el hospedador definitivo.

La teniasis intestinal por estas tenias no producen signos clínicos o son muy ligeros.

Se observan directamente en las heces los fragmentos del cuerpo de la tenia.

Tiene como hospedador definitivo los cerdos, en cuyo tubo digestivo se halla la tenia adulta.